

# **L'INCIDENZA DEI TUMORI IN PROVINCIA DI TRENTO ANNI 2003-2006**

## **Dati del Registro Tumori di popolazione**

Area Sistemi di Governance  
***Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa***

Silvano Piffer  
Laura Battisti  
Maddalena Cappelletti  
Maria A. Gentilini  
Roberto Rizzello  
Antonella Lunelli

Si ringrazia per la collaborazione:

Dott. Luca Fabbri, Direzione medica di presidio, Ospedale di Arco  
Dott. Domenico Gaetano, Direzione medica di presidio, Ospedale di Tione  
Dott. Guido Piazza, U.O. di Medicina, Ospedale di Cavalese  
Caposala Ameriga Zambaldi, Ospedale di Borgo Valsugana

Un particolare ringraziamento ai medici ed al personale delle U.O. di Anatomia Patologica, delle Direzioni sanitarie e dei reparti di degenza dei presidi ospedalieri provinciali, al personale addetto agli archivi sanitari e all'ospedale di Feltre.

*Un ringraziamento infine, per il supporto all'attività di registrazione dati, alla Sezione Trentina della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori*

## INDICE

---

Presentazione	5
L'andamento dei tumori maligni in provincia di Trento 1995-2006	7
L'incidenza	7
La mortalità	8
L'incidenza dei tumori maligni in provincia di Trento 2003-2006	9
Guida alla lettura dei dati	10
Tavole introduttive	12
La popolazione e il territorio della provincia di Trento	12
La struttura per età della popolazione standard mondiale ed europea	13
Sedi tumorali incluse nelle tabelle secondo la classificazione ICD9	14
Sintesi dei risultati	15
Sedi incidenti più frequenti per genere e fascia di età	16
Confronto per le 5 sedi più frequenti per incidenza e mortalità tra provincia di Trento e pool AIRTum	19
Schede per le singole sedi	21
Considerazioni riassuntive	85
Bibliografia essenziale	91
Appendice	
Tabelle analitiche per sede, sesso e classe di età- dati provinciali e per comprensorio	92



## PRESENTAZIONE

---

Nel 1997 la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha affidato all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), nello specifico all'Osservatorio Epidemiologico, la realizzazione di uno studio sulla fattibilità dell'istituzione di un Registro tumori di popolazione secondo il modello della Regione Veneto. Nel maggio 2001 sono stati diffusi i risultati dello studio di fattibilità, ossia i dati di incidenza dei tumori in provincia di Trento negli anni 1995-96. Di seguito, nell'ottobre 2003, sono stati pubblicati i dati di incidenza riferiti agli anni 1995-98. Nel gennaio 2008 sono stati pubblicati i dati di incidenza riferiti agli anni 1999-2002.

Nel 2005 viene attivato formalmente, con specifica delibera del Direttore Generale (n. 844 del 03/08/2005), il Registro tumori di popolazione della provincia di Trento presso l'Osservatorio Epidemiologico, assume la denominazione attuale di Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa in relazione al riassetto organizzativo di APSS conseguente alla Legge Provinciale 16 del 23.7.2010, di riordino del Servizio Sanitario Provinciale.

Questa pubblicazione presenta un aggiornamento dei dati di incidenza per il periodo 2003-2006 e si propone di offrire al lettore una presentazione dei dati più agevole, riducendo alcune parti descrittive a favore di una più facile ed immediata consultazione.

La rappresentazione dei dati 2003-2006 è preceduta da una sintesi sull'andamento dell'incidenza e della mortalità per quadrienni, nell'intero periodo 1995-2006

*I dati registrati dal Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa dell'APSS sono validati da parte dell'AIRTUM (Associazione italiana dei Registri Tumore) e da parte della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) di Lione, cui i dati trentini afferiscono per concorrere rispettivamente alla composizione della banca dati dei registri italiani e della basedati internazionale, necessaria alla realizzazione del rapporto mondiale periodico sull'incidenza dei tumori (Cancer Incidence in Five Continents).*



# L'ANDAMENTO DEI TUMORI MALIGNI IN PROVINCIA DI TRENTO


## Periodo 1995-2006

### I dati di incidenza


**Tab. 1** Provincia di Trento. Casi incidenti totali e casi/anno per genere e periodo. Tutte le sedi meno cute non melanomi. Periodo 1995-2006

		Periodo di osservazione		
		1995-98	1999-02	2003-06
<b>Maschi</b>	<b>Casi totali</b>	5.167	5.524	5.677
	<b>Casi/anno</b>	1.292	1.381	1.420
<b>Femmine</b>	<b>Casi totali</b>	4.539	4.926	4.869
	<b>Casi/anno</b>	1.135	1.232	1.218

**Fig. 1** Provincia di Trento. Tasso grezzo di incidenza /100.000 per genere e periodo. Tutte le sedi meno cute non melanomi



**Fig. 2** Provincia di Trento. Tasso standard (pop.mondiale) di incidenza/100.000, per genere e periodo. Tutte le sedi meno cute non melanomi



Il numero di nuovi casi di tumore registrati in provincia di Trento aumenta nel corso del tempo. Questo fenomeno avviene anche su scala nazionale-internazionale ed è in parte spiegabile con l'invecchiamento della popolazione che comporta di per sé un aumento del rischio di ammalarsi di tumore. Un'altra quota parte dell'aumento può essere attribuita all'espansione dei programmi di prevenzione, spontanei o organizzati, che comportano un aumento di casi diagnosticati e quindi registrati anticipatamente rispetto ad una possibile o potenziale manifestazione clinica.

All'aumento del numero di casi corrisponde comunque una riduzione del tasso di incidenza, ossia del gettito di nuovi casi/100.000 residenti che è il vero indicatore cui fare riferimento per capire l'andamento della patologia nel tempo.

Pur persistendo una differenza rilevante nella frequenza della malattia tra i due sessi, il decremento nel tempo del tasso di incidenza appare più rilevante nei maschi rispetto alle femmine.

## I dati di mortalità

Tab.2 Provincia di Trento. Decessi totali e decessi/anno per genere e periodo. Tutte le sedi

		Periodo di osservazione		
		1995-98	1999-02	2003-06
<b>Maschi</b>	<b>Casi totali</b>	2.992	3.175	3.198
	<b>Casi/anno</b>	748	794	800
<b>Femmine</b>	<b>Casi totali</b>	2.205	2.367	2.512
	<b>Casi/anno</b>	551	592	628

Fig.3 Provincia di Trento. Tasso grezzo di mortalità/100.000 per genere e periodo. Tutte le sedi





Fig. 4 Provincia di Trento. Tasso standard (pop.mondiale) di mortalità/100.000 per genere e periodo. Tutte le sedi



Quanto detto per l'incidenza, trova conferma anche nella rappresentazione dell'andamento del tasso di mortalità, dove il decremento nei maschi, facendo riferimento al tasso standardizzato (che tiene conto della struttura per età della popolazione in studio) appare molto più evidente che nelle femmine.



**L'INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI  
IN PROVINCIA DI TRENTO**

**ANNI 2003-2006**

## GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI

---

La pubblicazione è strutturata in schede specifiche per tumore; sono presentate 31 schede, che includono 27 sedi principali, il mesotelioma e il sarcoma di Kaposi, oltre all'insieme di tutte le sedi e di tutte le sedi escluse le forme cutanee non melanomi.

In ogni scheda viene presentato:

- **SINTESI DEI DATI.** Tabella con gli indicatori sintetici di incidenza e mortalità:
  - *numero casi*: frequenza delle nuove diagnosi e dei decessi nel quadriennio
  - *numero casi/anno*: frequenza media delle nuove diagnosi e dei decessi per anno
  - *% sul totale*: proporzione dei casi incidenti/decessi di ciascuna sede sul totale delle sedi (incluso cute non melanoma)
  - *tasso grezzo di incidenza e di mortalità*, ossia il rapporto tra il numero medio di casi incidenti/decessi registrati ogni anno e la popolazione media annuale residente in Provincia di Trento. I tassi sono riferiti ogni 100.000 abitanti e per anno
  - *tasso standardizzato di incidenza e di mortalità*; questi indicatori sono depurati dall'effetto della struttura per età della popolazione, permettono quindi di effettuare confronti con gli altri registri. La popolazione standard considerata è quella europea, il metodo usato è quello diretto
  - *rischio cumulato a 74 anni di incidenza e di mortalità*, ossia il rischio di sviluppare un tumore o di morire a causa di quel tumore nell'arco della vita che va dalla nascita a 74 anni
  - *età media*, ossia l'età media dei soggetti che hanno sviluppato/ sono deceduti a causa di quel tumore
  - *età mediana*, ossia la mediana delle età dei soggetti che hanno sviluppato/ sono deceduti a causa di quel tumore
- uno schema riassuntivo con il numero totale di nuove diagnosi per anno, totali e specifici per quel tumore, con la relativa divisione percentuale tra generi
- **MODALITA' DI DIAGNOSI.** Tabella di sintesi delle modalità con cui il tumore è stato diagnosticato, divise per genere (valori assoluti e percentuali)
- **MORFOLOGIE.** Tabella con le morfologie fra quelle dei casi per i quali è disponibile una conferma istologica della diagnosi
- i grafici delle distribuzioni percentuali dei casi incidenti e dei decessi per fasce d'età
- i grafici dei tassi grezzi d'incidenza e di mortalità specifici per età
- una tabella con gli indicatori di incidenza (numero di casi, tasso grezzo, tasso standardizzato sulla popolazione italiana al censimento 2001 ed europea) per comprensorio, separatamente per i due generi.
- i grafici dei tassi di incidenza standardizzati per comprensorio, separatamente per i due generi. La popolazione standard considerata è quella italiana al censimento 2001. Gli intervalli di confidenza sono stati calcolati al 95% con il metodo proposto da Fay e Feuer (Statistics in Medicine, Vol.16, 791-801 - 1997)
- una tabella con gli indicatori di qualità del registro, ovvero:
  - *MV*: percentuale di casi con verifica microscopica (morfologica)
  - *M/I*: rapporto mortalità/incidenza per 100

In Appendice sono riportate le tavole analitiche per l'intera Provincia per sesso, classi d'età e sede relative a: casi incidenti, tassi grezzi di incidenza, tassi standardizzati di incidenza sulla popolazione mondiale ed europea, rischio cumulato 0-74 anni, proporzioni calcolate su tutte le sedi, confronti con i Registri del Triveneto e con il pool dei Registri italiani.

Sono poi riportate le tavole analitiche per Comprensorio, sesso e sede relative a: casi incidenti per classi d'età, tassi grezzi e standardizzati (popolazione mondiale ed europea), rischi cumulati 0-74 anni e proporzioni calcolate su tutte le sedi.


Infine sono riportate le tavole analitiche per l'intera Provincia per sesso, classi d'età e sede relative alla mortalità (numeri assoluti, tassi grezzi, tassi standardizzati sulla popolazione mondiale ed europea, rischio cumulato 0-74 anni, proporzioni calcolate su tutte le sedi).

## TAVOLE INTRODUTTIVE

### La popolazione in provincia di Trento (Popolazione residente al 31 Dicembre 2006, dati PAT)

Comprensorio	MASCHI	FEMMINE	M+F
C1. Primiero	4.923	5.153	10.076
C2. Fiemme	9.478	9.755	19.233
C3. Bassa Valsugana	12.912	13.595	26.507
C4. Alta Valsugana	24.838	25.475	50.313
C5. Valle dell'Adige	82.052	86.926	168.978
C6. Valle di Non	19.072	19.328	38.400
C7. Valle di Sole	7.591	7.771	15.362
C8. Giudicarie e Rendena	18.055	18.549	36.604
C9. Alto Garda e Ledro	22.147	23.397	45.544
C10. Vallagarina	42.401	44.227	86.628
C11. Ladino di Fassa	4.639	4.746	9.385
<b>Provincia</b>	<b>248.108</b>	<b>258.922</b>	<b>507.030</b>

### Il Territorio suddiviso per comprensori



<b>C1 =</b>	Valle di Fiemme	<b>C2 =</b>	Primiero	<b>C3 =</b>	Bassa Valsugana	<b>C4 =</b>	Alta Valsugana
<b>C5 =</b>	Valle dell'Adige	<b>C6 =</b>	Valle di Non	<b>C7 =</b>	Valle di Sole	<b>C8 =</b>	Giudicarie-Rendena
<b>C9 =</b>	Alto Garda-Ledro	<b>C10 =</b>	Vallagarina	<b>C11 =</b>	Valle di Fassa		

**Struttura per età della popolazione standard mondiale ed europea e della popolazione italiana al censimento 2001**

Gruppi di età	Mondo	Europa	Italia 2001	Italia 2001	
				Maschi	Femmine
0-4	12.000	8.000	4.595	1.344.296	1.274.498
5-9	10.000	7.000	4.700	1.375.399	1.303.705
10-14	9.000	7.000	4.922	1.440.659	1.364.628
15-19	9.000	7.000	5.200	1.517.900	1.445.729
20-24	8.000	7.000	6.008	1.739.347	1.685.003
25-29	8.000	7.000	7.451	2.138.204	2.108.572
30-34	6.000	7.000	7.972	2.283.606	2.260.176
35-39	6.000	7.000	8.112	2.313.969	2.309.619
40-44	6.000	7.000	7.133	2.024.945	2.040.634
45-49	6.000	7.000	6.561	1.850.242	1.889.328
50-54	5.000	7.000	6.754	1.895.424	1.954.267
55-59	4.000	6.000	5.833	1.620.147	1.704.626
60-64	4.000	5.000	6.079	1.657.480	1.807.467
65-69	3.000	4.000	5.404	1.426.778	1.653.170
70-74	2.000	3.000	4.919	1.229.113	1.574.399
75-79	1.000	2.000	4.012	913.342	1.373.434
80-84	500	1.000	2.167	445.332	789.985
85+	500	1.000	2.176	370.799	869.522
<b>Totale</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.586.982</b>	<b>29.408.762</b>


## Sedi tumorali incluse nelle tabelle secondo ICD -10

ICD10	SEDE
C00	Labbro
C01-C02	Lingua
C07-C08	Ghiandole salivari
C03-C06	Bocca
C09-C10	Orofaringe
C11	Rinofaringe
C12-C13	Ipofaringe
C14	Faringe, NAS
C15	Esofago
C16	Stomaco
C17	Intestino tenue
C18	Colon
C19-C21	Retto
C22	Fegato
C23-C24	Vie biliari
C25	Pancreas
C30-C31	Cavità nasali
C32	Laringe
C33-C34	Polmone
C37-C39	Altri organi toracici
C45	Mesotelioma
C40-C41	Osso
C47,C49	Tessuti molli
C46	Sarcoma di Kaposi
C43	Pelle, melanomi
C44	Pelle, non melanomi
C50	Mammella
C55	Utero, NAS
C53	Utero, cervice
C54	Utero, corpo
C56	Ovaio
C51-C52,C57	Altri genitali femminili
C61	Prostata
C62	Testicolo
C60	Pene
C63	Altri genitali maschili
C67	Vescica
C64-C66,C68	Rene, vie urinarie
C69	Occhio
C70-C72	Encefalo e altro SNC
C73	Tiroide
C74-C75	Altre ghiandole endocrine
C81	Linfoma di Hodgkin
C82-C85,C96	Linfoma non Hodgkin
C88-C90	Mieloma
C91	Leucemia linfatica
C92	Leucemia mieloide
C93	Leucemia monocitica
C94	Altre leucemie
C95	Leucemie, NAS
OeU	Mal definite e metastasi
ALLB	Tutte le sedi meno cute
ALLT	Tutte le sedi

## Fig. A: INCIDENZA

### Maschi

Encefalo	1,2%
Vie aereo digestive sup.	4,9%
Tiroide	0,7%
Melanoma cutaneo	1,7%
Polmone	10,9%
Fegato e vie biliari	5,3%
Esofago	1,9%
Stomaco	4,2%
Pancreas	2,4%
Colon e retto	11,3%
Prostata	15,8%
App. urinario	10,5%
Testicolo	1,2%
Leucemie, linfomi, mielomi	6,2%
Osso	0,2%
Cute, non melanoma	15,3%
Altre sedi, mal definiti	3,4%




### Femmine

Encefalo	1,2%
Vie aereo digestive sup.	1,1%
Tiroide	2,7%
Melanoma cutaneo	1,8%
Polmone	4,2%
Mammella	25,3%
Esofago	0,4%
Fegato e vie biliari	3,1%
Stomaco	3,6%
Pancreas	3,2%
Ovaio	2,6%
Utero (corpo e cervice)	4,9%
Osso	0,1%
Colon retto	9,7%
App. urinario	4,7%
Leucemie, linfomi, mielomi	7,4%
Cute, non melanoma	16,8%
Altre sedi, mal definiti	3,4%

## Fig. B: MORTALITA'

### Maschi

Encefalo	2,3%
Vie aereo digestive sup.	5,3%
Tiroide	0,3%
Melanoma cutaneo	0,9%
Polmone	23,3%
Fegato e vie biliari	9,4%
Esofago	3,7%
Stomaco	6,8%
Pancreas	4,6%
Colon e retto	11,5%
Prostata	9,2%
App. urinario	7,5%
Testicolo	0,1%
Leucemie, linfomi, mielomi	6,6%
Osso	0,3%
Cute, non melanoma	0,4%
Altre sedi, mal definiti	6,2%



### Femmine


Encefalo	3,5%
Vie aereo digestive sup.	1,1%
Tiroide	0,2%
Melanoma cutaneo	0,7%
Polmone	10,2%
Mammella	14,5%
Esofago	0,9%
Fegato e vie biliari	7,7%
Stomaco	6,5%
Pancreas	6,9%
Ovaio	5,2%
Utero (corpo e cervice)	2,0%
Colon retto	10,8%
App. urinario	4,7%
Leucemie, linfomi, mielomi	10,0%
Osso	0,2%
Cute, non melanoma	0,4%
Altre sedi, mal definiti	9,4%

Le percentuali sono calcolate considerando tutte le sedi.


# SEDI INCIDENTI PIU' FREQUENTI, PER GENERE E FASCIA D'ETA'

## Tutte le età

Maschi (6701 casi)




Femmine (5854 casi)




## Classi di età

### 0-14 anni

Maschi (22 casi)




Femmine (24 casi)




### 15-29 anni

Maschi (77 casi)




Femmine (72 casi)






### 30- 44 anni

Maschi (256 casi)




Femmine (482 casi)




### 45-54 anni

Maschi (595 casi)




Femmine (737 casi)




### 55-64 anni

Maschi (1383 casi)




Femmine (1026 casi)




### 65-74 anni

Maschi (2129 casi)




Femmine (1279 casi)




## 75+ anni

Maschi (2239 casi)




Femmine (2234 casi)




## CONFRONTO PER LE 5 SEDI PIU' FREQUENTI PER GENERE TRA PROVINCIA DI TRENTO E POOL AIRTUM

### INCIDENZA

Provincia di Trento. Prime cinque sedi (escluso la cute) per genere. Anni 2003-2006. Valori percentuali





AIRTUM – POOL registri Tumore italiani. Prime cinque sedi (escluso la cute) per genere. Anni 2005-2007. Valori percentuali






# MORTALITA'

Provincia di Trento. Prime cinque sedi per frequenza per genere. Anni 2003-2006. Valori percentuali



AIRTUM – POOL registri Tumore italiani. Prime cinque sedi per frequenza per genere. Anni 2003-2006. Valori percentuali





# Tutti i tumori

ICD10 C00-95

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	6.701	5.854	3.198	2.512
Numero casi / anno	1.676	1.464	800	628
% sul totale	100,0	100,0	100,0	100,0
Tasso grezzo	690,6	576,4	329,6	247,3
Tasso std (EUR)	540,5	387,9	245,9	130,4
Rischio cumulato (0-74)	44,2	30,8	17,5	9,0
Età media	67,7	66,9	72,3	75
Età mediana	69	69	74	78

**OGNI ANNO**  
**3.140**  
 nuove persone malate di tumore


di cui

♀ 53% ♂ 47%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	5.323	79,4	4.708	80,4
Citologica	645	9,6	466	8,0
Clinica	532	7,9	457	7,8
Autoptica	10	0,1	8	0,1
Istologica su metastasi	154	2,3	152	2,6
DCO	37	0,6	63	1,1


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	57,5	616,6	639,0	492,9
Primiero	35,8	733,1	718,2	552,4
Bassa Valsugana	78,3	614,7	615,4	470,2
Alta Valsugana	160,8	674,2	731,0	561,0
Valle dell'Adige	586,3	729,0	744,9	572,3
Valle di Non	121,5	647,9	643,5	491,4
Valle di Sole	53,5	713,7	709,8	553,5
Giudicarie	127,8	718,2	722,6	554,4
Alto Garda	146,0	679,7	681,6	529,0
Vallagarina	282,0	683,5	683,2	524,1
Fassa	26,0	565,5	679,6	520,4

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	50,8	527,2	525,2	359,2
Primiero	26,3	516,1	461,9	304,7
Bassa Valsugana	80,8	601,4	544,1	383,1
Alta Valsugana	142,3	579,3	583,8	394,4
Valle dell'Adige	494,8	579,3	566,1	392,7
Valle di Non	109,5	574,6	548,2	380,6
Valle di Sole	43,5	563,3	550,3	373,3
Giudicarie	106,8	581,1	556,7	393,9
Alto Garda	130,0	571,3	570,1	398,2
Vallagarina	260,3	602,1	579,5	400,9
Fassa	18,8	400,0	467,7	297,5


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori sia per quanto riguarda i maschi sia per quanto riguarda le femmine.

### Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
91,3	45,5	0,8



# Tutti i tumori (escluso cute non melanoma)

ICD10 C00-43,45-95

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	5.677	4.869	3.186	2.502
Numero casi / anno	1.420	1.217	796	626
% sul totale	84,7	83,2	99,6	99,6
Tasso grezzo	585,1	479,4	328,4	246,3
Tasso std (EUR)	457,4	325,7	245,0	130,0
Rischio cumulato (0-74)	37,6	26,1	17,5	9,0
Età media	67,7	66,6	72,3	75
Età mediana	69	69	74	78

OGNI ANNO

**3.140**

nuove persone malate di tumore

**2.637**

nuove persone malate di tumore esclusi i tumori non melanomatosi della cute


di cui

♀ 46% ♂ 54%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	4.299	75,7	3.725	76,5
Citologica	645	11,4	465	9,6
Clinica	532	9,4	456	9,4
Autoptica	10	0,2	8	0,2
Istologica su metastasi	154	2,7	152	3,1
DCO	37	0,7	63	1,3


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	47,5	509,4	527,7	404,9
Primiero	30,3	620,3	603,9	465,3
Bassa Valsugana	70,5	553,8	555,0	424,3
Alta Valsugana	137,8	577,8	629,4	479,9
Valle dell'Adige	483,3	600,9	614,7	470,9
Valle di Non	103,3	550,5	545,5	417,6
Valle di Sole	50,3	670,3	665,7	520,2
Giudicarie	112,0	629,6	634,4	489,4
Alto Garda	123,5	574,9	578,8	446,6
Vallagarina	238,5	578,1	577,6	441,5
Fassa	22,5	489,4	580,3	450,1

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	44,0	457,1	456,4	316,5
Primiero	21,3	417,8	375,3	249,1
Bassa Valsugana	66,8	497,2	450,9	322,1
Alta Valsugana	118,5	482,6	489,1	332,3
Valle dell'Adige	401,8	470,4	459,4	320,4
Valle di Non	88,3	463,1	444,4	311,9
Valle di Sole	39,0	505,1	497,3	341,9
Giudicarie	93,5	509,0	490,5	348,4
Alto Garda	108,8	477,9	478,2	334,5
Vallagarina	219,0	506,7	488,6	341,6
Fassa	16,5	352,0	410,9	264,6

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi sia per quanto riguarda le femmine.

### Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
89,7	53,9	0,9






# Vie aerodigestive superiori

ICD10 C01-06,09-14,32

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	328	64	172	31
Numero casi / anno	82	16	43	8
% sul totale	4,9	1,1	5,3	1,1
Tasso grezzo	33,8	6,3	17,7	3,1
Tasso std (EUR)	27,9	4,4	14,0	1,8
Rischio cumulato (0-74)	2,4	0,4	1,0	0,1
Età media	64,1	67,6	67,8	73,4
Età mediana	64	69	68	76




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	315	96,0	58	90,6
Citologica	6	1,8	2	3,1
Clinica	7	2,1	2	3,1
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	2	3,1


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	313	83,9
Adenocarcinoma	6	1,6
Altre morfologie	20	5,4
Carcinoma NAS	34	9,1


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	4,5	48,3	49,8	40,3
Primiero	1,8	35,9	36,3	28,9
Bassa Valsugana	2,8	21,6	20,5	17,2
Alta Valsugana	7,8	32,5	34,3	29,3
Valle dell'Adige	25,8	32,0	32,2	26,6
Valle di Non	5,5	29,3	29,1	22,5
Valle di Sole	3,5	46,7	44,5	40,1
Giudicarie	8,8	49,2	49,5	41,7
Alto Garda	8,3	38,4	38,7	32,6
Vallagarina	11,8	28,5	27,8	21,8
Fassa	1,8	38,1	44,9	34,5

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,3	2,6	2,8	2,9
Primiero	0,3	4,9	3,0	1,1
Bassa Valsugana	0,8	5,6	4,6	3,0
Alta Valsugana	1,8	7,1	6,8	4,5
Valle dell'Adige	4,3	5,0	4,8	2,9
Valle di Non	2,0	10,5	10,9	8,7
Valle di Sole	1,0	13,0	12,0	5,9
Giudicarie	1,8	9,5	9,9	8,5
Alto Garda	1,8	7,7	8,2	6,0
Vallagarina	2,3	5,2	5,2	3,9
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
97,2	51,8	0,5




# Esofago

ICD10 C15

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	124	23	118	22
Numero casi / anno	32	6	30	6
% sul totale	1,9	0,4	3,7	0,9
Tasso grezzo	12,8	2,3	12,2	2,2
Tasso std (EUR)	9,9	1,1	9,3	1,0
Rischio cumulato (0-74)	0,8	0,1	0,8	0,1
Età media	69	75,7	70,3	77,2
Età mediana	69	75	72	79,5

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	117	94,4	18	78,3
Citologica	1	0,8	0	0,0
Clinica	4	3,2	4	17,4
Autoptica	1	0,8	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	1	0,8	1	4,3


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	87	64,0
Adenocarcinoma	31	22,8
Altre morfologie	5	3,7
Carcinoma NAS	13	9,6


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,0	10,7	10,1	7,3
Primiero	0,5	10,3	10,5	7,6
Bassa Valsugana	0,8	5,9	5,5	4,8
Alta Valsugana	3,3	13,6	15,0	11,5
Valle dell'Adige	12,3	15,2	15,3	11,5
Valle di Non	3,3	17,3	18,0	12,9
Valle di Sole	1,5	20,0	19,3	15,9
Giudicarie	2,0	11,2	11,5	9,6
Alto Garda	2,0	9,3	8,9	7,8
Vallagarina	4,3	10,3	9,9	8,0
Fassa	0,3	5,4	10,5	7,8

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,3	1,9	1,0	0,4
Alta Valsugana	1,0	4,1	4,1	1,9
Valle dell'Adige	1,0	1,2	1,2	0,7
Valle di Non	0,5	2,6	2,9	2,1
Valle di Sole	0,3	3,2	3,6	2,5
Giudicarie	0,5	2,7	2,6	1,4
Alto Garda	1,0	4,4	4,3	2,1
Vallagarina	1,0	2,3	2,1	0,9
Fassa	0,3	5,3	4,9	1,8


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
93,2	95,2	1,30




# Stomaco

ICD10 C16

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	279	211	219	164
Numero casi / anno	70	52	54	42
% sul totale	4,2	3,6	6,8	6,5
Tasso grezzo	28,8	20,8	22,6	16,1
Tasso std (EUR)	21,9	11,1	16,6	7,2
Rischio cumulato (0-74)	1,7	0,8	1,0	0,4
Età media	70,5	73,6	73,8	78,2
Età mediana	73	77	76	80




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	263	94,3	185	87,7
Citologica	1	0,4	1	0,5
Clinica	8	2,9	18	8,5
Autoptica	1	0,4	0	0,0
Istologica su metastasi	2	0,7	0	0,0
DCO	4	1,4	7	3,3


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma NAS	295	65,4
Adenoca di tipo intestinale	33	7,3
Carcinoma ad anello con castone (cellule a sigillo)	52	11,5
Altre morfologie	47	10,4
Carcinoma NAS	10	2,2
Altri adenoca specificati	14	3,1


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,3	24,1	23,2	16,4
Primiero	1,8	35,9	36,3	28,2
Bassa Valsugana	2,3	17,7	17,4	12,9
Alta Valsugana	6,5	27,3	28,1	21,2
Valle dell'Adige	19,5	24,2	25,1	19,5
Valle di Non	6,3	33,3	33,2	24,6
Valle di Sole	2,5	33,3	35,2	24,6
Giudicarie	6,3	35,1	32,8	24,2
Alto Garda	5,8	26,8	26,8	20,8
Vallagarina	15,0	36,4	37,1	26,4
Fassa	1,8	38,1	43,1	33,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,5	26,0	23,5	15,5
Primiero	2,0	39,3	30,8	14,1
Bassa Valsugana	2,5	18,6	15,2	8,3
Alta Valsugana	4,5	18,3	18,2	9,0
Valle dell'Adige	15,8	18,4	17,9	10,0
Valle di Non	6,0	31,5	27,3	14,4
Valle di Sole	1,5	19,4	18,3	11,3
Giudicarie	6,8	36,7	35,2	20,7
Alto Garda	2,3	9,9	10,6	7,2
Vallagarina	8,3	19,1	18,2	10,1
Fassa	0,8	16,0	17,0	11,2


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Le differenze tra comprensori non risultano statisticamente significative per quanto riguarda i maschi. Nelle femmine emerge invece un eccesso di casi, ai limiti della significatività statistica, per quanto riguarda il comprensorio Giudicarie-Rendena.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
92,4	78,2	2,2




# Colon

ICD10 C18

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	428	377	249	201
Numero casi / anno	108	94	62	50
% sul totale	6,4	6,4	7,8	8,0
Tasso grezzo	44,1	37,1	25,7	19,8
Tasso std (EUR)	33,9	21,0	19,2	9,9
Rischio cumulato (0-74)	2,8	1,7	1,4	0,6
Età media	70	73,4	73,4	75,9
Età mediana	70,5	75	74	79

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	414	96,7	354	93,9
Citologica	1	0,2	3	0,8
Clinica	11	2,6	18	4,8
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	1	0,2	0	0,0
DCO	1	0,2	2	0,5


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma NAS	666	86,6
Adenocarcinoma specificato	86	11,2
Altre morfologie	17	2,2
Carcinoma NAS	0	0,0


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	3,8	40,2	44,2	34,5
Primiero	1,8	35,9	32,3	25,0
Bassa Valsugana	6,3	49,1	47,7	37,2
Alta Valsugana	11,5	48,2	51,9	40,5
Valle dell'Adige	38,0	47,3	48,0	35,5
Valle di Non	7,5	40,0	40,8	30,2
Valle di Sole	2,0	26,7	27,2	21,7
Giudicarie	6,8	37,9	38,8	30,5
Alto Garda	9,0	41,9	42,2	31,4
Vallagarina	19,3	46,7	46,8	35,8
Fassa	1,3	27,2	33,1	23,4

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	3,5	36,4	35,3	21,5
Primiero	1,0	19,7	16,2	7,1
Bassa Valsugana	3,5	26,1	24,2	15,1
Alta Valsugana	8,8	35,6	36,9	20,5
Valle dell'Adige	37,8	44,2	43,1	25,3
Valle di Non	5,3	27,5	25,6	13,8
Valle di Sole	2,3	29,1	25,7	14,8
Giudicarie	5,5	29,9	28,0	16,2
Alto Garda	8,5	37,4	38,7	25,8
Vallagarina	17,5	40,5	37,8	20,7
Fassa	0,8	16,0	19,0	14,1

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emerge alcuna differenza statisticamente significativa tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
96,0	55,9	0,2






# Retto

ICD10 C19-21

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	326	194	117	71
Numero casi / anno	82	48	30	18
% sul totale	4,9	3,3	3,7	2,8
Tasso grezzo	33,6	19,1	12,1	7,0
Tasso std (EUR)	26,3	12,7	9,3	3,7
Rischio cumulato (0-74)	2,3	1,1	0,7	0,2
Età media	67,9	69,5	70,5	76,7
Età mediana	69	69,5	73	77

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	320	98,2	192	99,0
Citologica	0	0,0	1	0,5
Clinica	5	1,5	1	0,5
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	1	0,3	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma NAS	425	82,8
Adenocarcinoma specificato	57	11,1
Altre morfologie	28	5,5
Carcinoma NAS	3	0,6


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,0	21,4	21,6	16,9
Primiero	1,3	25,6	23,5	16,5
Bassa Valsugana	4,3	33,4	33,8	26,6
Alta Valsugana	8,3	34,6	38,6	28,7
Valle dell'Adige	28,8	35,7	36,9	27,7
Valle di Non	5,5	29,3	28,6	21,3
Valle di Sole	3,5	46,7	45,0	38,7
Giudicarie	6,3	35,1	36,3	28,7
Alto Garda	8,0	37,2	37,5	29,4
Vallagarina	12,8	30,9	31,2	24,2
Fassa	1,0	21,8	24,1	19,3

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,8	28,6	29,2	21,4
Primiero	0,5	9,8	9,4	7,0
Bassa Valsugana	3,0	22,3	20,6	12,9
Alta Valsugana	5,3	21,4	21,5	14,5
Valle dell'Adige	14,3	16,7	16,7	10,9
Valle di Non	3,3	17,1	18,2	13,8
Valle di Sole	1,3	16,2	15,0	11,2
Giudicarie	3,5	19,1	18,5	11,6
Alto Garda	5,3	23,1	23,7	16,9
Vallagarina	8,8	20,2	19,9	12,2
Fassa	0,8	16,0	20,5	11,9


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Le differenze per comprensorio non sono statisticamente significative, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
98,8	36,2	0,0




# Colon-retto

ICD10 C18-21

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	754	571	366	272
Numero casi / anno	189	143	92	68
% sul totale	11,3	9,7	11,4	10,8
Tasso grezzo	77,7	56,2	37,7	26,8
Tasso std (EUR)	60,2	33,7	28,5	13,5
Rischio cumulato (0-74)	5,1	2,8	2,1	0,9
Età media	69,1	72,1	72,5	76,1
Età mediana	70	73	73,6	78,9

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	734	97,3	546	95,6
Citologica	1	0,1	4	0,7
Clinica	16	2,1	19	3,3
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	2	0,3	0	0,0
DCO	1	0,1	2	0,4


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma NAS	1091	85,1
Adenoca. specificato	144	11,2
Altre morfologie	44	3,4
Carcinoma NAS	3	0,2


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	5,8	61,7	65,7	51,4
Primiero	3,0	61,5	55,7	41,5
Bassa Valsugana	10,5	82,5	81,5	63,8
Alta Valsugana	19,8	82,8	90,6	69,2
Trento	66,8	83,0	84,9	63,1
Valle di Non	13,0	69,3	69,3	51,5
Valle di Sole	5,5	73,4	72,3	60,4
Giudicarie	13,0	73,1	75,1	59,2
Alto Garda	17,0	79,1	79,7	60,8
Vallagarina	32,0	77,6	78,1	59,9
Fassa	2,3	48,9	57,1	42,7

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	6,3	64,9	64,5	43,0
Primiero	1,5	29,5	25,6	14,1
Bassa Valsugana	6,5	48,4	44,8	28,0
Alta Valsugana	14,0	57,0	58,4	35,0
Trento	52,0	60,9	59,7	36,2
Valle di Non	8,5	44,6	43,8	27,6
Valle di Sole	3,5	45,3	40,6	26,0
Giudicarie	9,0	49,0	46,5	27,8
Alto Garda	13,8	60,4	62,4	42,7
Vallagarina	26,3	60,7	57,7	33,0
Fassa	1,5	32,0	39,6	26,1


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emerge alcuna differenza statisticamente significativa tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
97,1	48,2	0,2




# Fegato

ICD10 C22

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	296	83	242	107
Numero casi / anno	74	20	60	26
% sul totale	4,4	1,4	7,6	4,3
Tasso grezzo	30,5	8,2	24,9	10,5
Tasso std (EUR)	23,4	4,3	18,5	5,0
Rischio cumulato (0-74)	2,0	0,3	1,4	0,3
Età media	69,4	75,1	71,5	77,8
Età mediana	70	76	73	78




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	32	10,8	7	8,4
Citologica	121	40,9	21	25,3
Clinica	134	45,3	47	56,6
Autoptica	1	0,3	2	2,4
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	8	2,7	6	7,2


## Morfologie

Istotipo	N	%
Epatocarcinoma	29	69,0
Colangiocarcinoma	7	16,7
Altro adenocarcinoma specificato	5	11,9
Altre morfologie	1	2,4


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	3,0	32,2	33,4	25,0
Primiero	0,5	10,3	9,6	6,5
Bassa Valsugana	2,8	21,6	20,8	13,9
Alta Valsugana	7,0	29,4	33,4	23,8
Valle dell'Adige	21,5	26,7	27,5	21,1
Valle di Non	4,8	25,3	25,0	20,6
Valle di Sole	2,0	26,7	26,3	19,6
Giudicarie	7,5	42,2	43,2	32,2
Alto Garda	7,3	33,8	33,8	24,7
Vallagarina	16,0	38,8	38,5	28,6
Fassa	1,8	38,1	44,7	31,9

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,5	15,6	16,4	9,5
Primiero	0,3	4,9	3,0	1,1
Bassa Valsugana	0,8	5,6	4,5	2,4
Alta Valsugana	2,8	11,2	12,0	6,3
Valle dell'Adige	5,5	6,4	6,0	3,2
Valle di Non	1,0	5,2	5,6	3,6
Valle di Sole	0,5	6,5	6,6	3,8
Giudicarie	2,0	10,9	10,1	5,9
Alto Garda	1,5	6,6	6,2	3,7
Vallagarina	4,3	9,8	9,4	5,0
Fassa	0,8	16,0	23,3	8,6


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
48,5	92,1	3,7




# Colecisti e vie biliari

ICD10 C23-24

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	61	100	57	85
Numero casi / anno	16	26	14	22
% sul totale	0,9	1,7	1,8	3,4
Tasso grezzo	6,3	9,8	5,9	8,4
Tasso std (EUR)	4,4	5,0	4,3	4,1
Rischio cumulato (0-74)	0,2	0,4	0,3	0,3
Età media	73,8	76,1	73,4	76,8
Età mediana	76	78	75	79

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	22	36,1	45	45,0
Citologica	14	23,0	18	18,0
Clinica	24	39,3	34	34,0
Autoptica	0	0,0	1	1,0
Istologica su metastasi	1	1,6	0	0,0
DCO	0	0,0	2	2,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma	57	82,6
Altre morfologie	9	13,0
Carcinoma NAS	3	4,3


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,4	5,5	3,9
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,5	3,9	3,8	2,3
Alta Valsugana	2,5	10,5	10,8	7,5
Valle dell'Adige	4,5	5,6	5,5	3,9
Valle di Non	1,0	5,3	4,7	3,0
Valle di Sole	0,8	10,0	10,8	7,8
Giudicarie	1,0	5,6	5,2	4,5
Alto Garda	1,5	7,0	6,9	4,6
Vallagarina	2,5	6,1	6,6	4,7
Fassa	0,5	10,9	12,6	8,8

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,0	10,4	9,7	3,6
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	1,0	7,4	5,5	3,3
Alta Valsugana	2,0	8,1	7,5	3,2
Valle dell'Adige	11,5	13,5	12,9	6,8
Valle di Non	2,0	10,5	9,2	4,3
Valle di Sole	0,5	6,5	7,0	4,5
Giudicarie	1,5	8,2	7,6	5,1
Alto Garda	1,0	4,4	4,4	3,9
Vallagarina	4,3	9,8	9,5	5,4
Fassa	0,3	5,3	7,7	3,3

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
62,7	88,2	0,1






# Pancreas

ICD10 C25

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	164	186	146	173
Numero casi / anno	42	46	36	44
% sul totale	2,4	3,2	4,6	6,9
Tasso grezzo	16,9	18,3	15,0	17,0
Tasso std (EUR)	13,5	10,1	11,7	8,8
Rischio cumulato (0-74)	1,2	0,8	1,0	0,6
Età media	67,2	74	68,8	75,3
Età mediana	67	75	69	77

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	40	24,4	27	14,5
Citologica	37	22,6	43	23,1
Clinica	77	47,0	104	55,9
Autoptica	1	0,6	0	0,0
Istologica su metastasi	6	3,7	7	3,8
DCO	3	1,8	5	2,7


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma	62	76,5
Altre morfologie	19	23,5


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,3	13,4	14,0	10,8
Primiero	1,0	20,5	21,4	16,0
Bassa Valsugana	2,8	21,6	21,6	17,3
Alta Valsugana	3,5	14,7	15,8	12,0
Valle dell'Adige	14,8	18,3	19,0	14,1
Valle di Non	4,3	22,7	22,4	18,9
Valle di Sole	2,3	30,0	30,7	23,7
Giudicarie	2,3	12,6	12,8	10,1
Alto Garda	3,0	14,0	13,5	11,9
Vallagarina	5,0	12,1	12,5	10,3
Fassa	1,0	21,8	30,3	21,4

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,2	5,6	2,4
Primiero	0,8	14,7	12,5	5,9
Bassa Valsugana	3,0	22,3	20,4	12,2
Alta Valsugana	3,8	15,3	15,1	8,3
Valle dell'Adige	14,5	17,0	16,9	9,6
Valle di Non	3,5	18,4	18,2	12,6
Valle di Sole	2,3	29,1	29,9	16,9
Giudicarie	4,0	21,8	20,0	11,5
Alto Garda	4,5	19,8	18,7	9,9
Vallagarina	9,3	21,4	20,5	11,1
Fassa	0,5	10,7	11,5	10,7


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
46,0	91,1	2,2




# Polmone

ICD10 C33-34

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	731	243	744	257
Numero casi / anno	182	60	186	64
% sul totale	10,9	4,2	23,3	10,2
Tasso grezzo	75,3	23,9	76,7	25,3
Tasso std (EUR)	57,2	14,8	56,8	13,9
Rischio cumulato (0-74)	4,6	1,2	4,3	1,1
Età media	70,2	70,5	72,1	74,2
Età mediana	72	73	73	75

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	371	50,8	102	42,0
Citologica	202	27,6	71	29,2
Clinica	137	18,7	60	24,7
Autoptica	4	0,5	0	0,0
Istologica su metastasi	8	1,1	3	1,2
DCO	9	1,2	7	2,9


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	175	35,9
Adenocarcinoma	167	34,2
Piccole cellule	61	12,5
Grandi cellule	15	3,1
Altre morfologie	61	12,5
Carcinoma NAS	9	1,8


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	5,0	53,6	54,2	40,1
Primiero	3,5	71,8	67,1	48,6
Bassa Valsugana	10,0	78,6	78,7	58,6
Alta Valsugana	15,5	65	72,6	53,7
Valle dell'Adige	62,8	78	80,2	60,8
Valle di Non	14,0	74,7	73,6	54,0
Valle di Sole	4,8	63,4	63,7	45,7
Giudicarie	15,3	85,7	83,9	61,5
Alto Garda	13,3	61,7	60,9	44,1
Vallagarina	36,8	89,1	88,3	66,6
Fassa	2,0	43,5	55,2	42,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,0	20,8	20,3	11,3
Primiero	1,8	34,4	33,7	23,1
Bassa Valsugana	3,5	26,1	22,0	14,3
Alta Valsugana	5,8	23,4	22,6	12,3
Valle dell'Adige	22,3	26,1	25,4	16,5
Valle di Non	3,5	18,4	16,6	9,8
Valle di Sole	1,3	16,2	15,7	12,2
Giudicarie	2,3	12,2	12,5	9,1
Alto Garda	6,3	27,5	26,6	17,2
Vallagarina	12,0	27,8	26,9	17,3
Fassa	0,3	5,3	5,7	4,6


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
78,1	102,8	1,6




# Ossso

ICD10 C40-41

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	15	3	9	5
Numero casi / anno	4	1	2	2
% sul totale	0,2	0,1	0,3	0,2
Tasso grezzo	1,5	0,3	0,9	0,5
Tasso std (EUR)	1,5	0,3	0,9	0,3
Rischio cumulato (0-74)	0,1	0,0	0,1	0,0
Età media	43,9	43,3	48,8	75
Età mediana	41	61	63	81

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	13	86,7	2	66,7
Citologica	0	0,0	0	0,0
Clinica	2	13,3	1	33,3
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Neoplasie fibromatose	2	13,3
Neoplasie ossee e cartilaginee	9	60,0
Tumori osso miscellanea	2	13,3
Tumori miscellanea	1	6,7
Carcinoma NAS	1	6,7


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,4	5,5	4,0
Primiero	0,3	5,1	5,4	4,5
Bassa Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Alta Valsugana	0,3	1,0	1,0	1,1
Valle dell'Adige	1,8	2,2	2,1	2,2
Valle di Non	0,3	1,3	1,5	1,1
Valle di Sole	0,0	0,0	0,0	0,0
Giudicarie	0,3	1,4	1,3	1,2
Alto Garda	0,3	1,2	1,1	1,1
Vallagarina	0,0	0,0	0,0	0,0
Fassa	0,3	5,4	6,0	5,4

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Alta Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle dell'Adige	0,5	0,6	0,6	0,5
Valle di Non	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle di Sole	0,0	0,0	0,0	0,0
Giudicarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Alto Garda	0,0	0,0	0,0	0,0
Vallagarina	0,3	0,6	0,5	1,0
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



La scarsa consistenza della casistica non consente una sicura confrontabilità tra comprensori. Il confronto tra le aree geografiche interessate non permette comunque di mettere in evidenza differenze statisticamente significative, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
83,3	77,8	0,0




# Melanoma

ICD10 C43

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	114	108	28	17
Numero casi / anno	28	28	8	4
% sul totale	1,7	1,8	0,9	0,7
Tasso grezzo	11,7	10,6	2,9	1,7
Tasso std (EUR)	10,0	8,7	2,3	1,0
Rischio cumulato (0-74)	0,8	0,7	0,2	0,1
Età media	59,7	56,1	63,4	70,6
Età mediana	62,5	56	62	70




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	111	97,4	105	97,2
Citologica	1	0,9	0	0,0
Clinica	0	0,0	0	0,0
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	2	1,8	3	2,8
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Melanoma maligno a diffu-	130	58,8
Melanoma maligno NAS	48	21,7
Melanoma maligno nodulare	33	14,9
Altro melanoma specificato	10	4,5


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,0	10,7	11,8	10,1
Primiero	1,0	20,5	20,2	19,0
Bassa Valsugana	1,0	7,9	8,4	7,0
Alta Valsugana	2,5	10,5	10,5	9,8
Valle dell'Adige	11,0	13,7	13,9	11,0
Valle di Non	1,0	5,3	5,7	4,6
Valle di Sole	0,8	10,0	9,3	7,1
Giudicarie	2,5	14,1	14,4	11,8
Alto Garda	2,5	11,6	12,2	11,0
Vallagarina	4,5	10,9	10,8	9,0
Fassa	0,8	16,3	18,6	16,1

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,2	5,2	4,4
Primiero	1,5	29,5	28,7	25,2
Bassa Valsugana	1,8	13,0	12,3	9,0
Alta Valsugana	3,0	12,2	12,8	11,3
Valle dell'Adige	8,5	10,0	9,9	8,2
Valle di Non	0,8	3,9	3,6	2,9
Valle di Sole	0,5	6,5	6,6	3,8
Giudicarie	1,3	6,8	7,0	6,6
Alto Garda	2,0	8,8	7,9	6,1
Vallagarina	6,8	15,6	15,2	12,6
Fassa	0,5	10,7	9,2	8,8

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	20,3	0,0





# Cute non melanoma

ICD10 C44

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	1.024	985	12	10
Numero casi / anno	256	246	4	2
% sul totale	15,3	16,8	0,4	0,4
Tasso grezzo	105,5	97,0	1,2	1,0
Tasso std (EUR)	83,1	62,1	0,9	0,4
Rischio cumulato (0-74)	6,5	4,7	0,1	0,0
Età media	67,5	68,2	78,8	86,1
Età mediana	69	71	81,5	91

## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	1.024	100,0	983	99,8
Citologica	0	0,0	1	0,1
Clinica	0	0,0	1	0,1
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**502**  
nuove persone malate di  
tumore della cute non melanomatoso


di cui

♀ 49% ♂ 51%


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	287	14,3
Neoplasie a cellule basali	1402	69,9
Altre morfologie	29	1,4
Carcinoma NAS	289	14,4


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	10,0	107,2	111,3	88,0
Primiero	5,5	112,8	114,2	87,1
Bassa Valsugana	7,8	60,9	60,4	45,9
Alta Valsugana	23,0	96,5	101,6	81,1
Valle dell'Adige	103,0	128,1	130,3	101,4
Valle di Non	18,3	97,3	98,1	73,8
Valle di Sole	3,3	43,4	44,1	33,3
Giudicarie	15,8	88,5	88,3	65,0
Alto Garda	22,5	104,7	102,8	82,4
Vallagarina	43,5	105,4	105,7	82,5
Fassa	3,5	76,1	99,3	70,3

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	6,8	70,1	68,8	42,7
Primiero	5,0	98,3	86,6	55,6
Bassa Valsugana	14,0	104,3	93,2	61,0
Alta Valsugana	23,8	96,7	94,7	62,0
Valle dell'Adige	93,0	108,9	106,8	72,2
Valle di Non	21,3	111,5	103,8	68,7
Valle di Sole	4,5	58,3	52,9	31,4
Giudicarie	13,3	72,1	66,1	45,5
Alto Garda	21,3	93,4	92,0	63,7
Vallagarina	41,3	95,4	90,9	59,3
Fassa	2,3	48,0	56,8	33,0

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Nei maschi emerge un eccesso, statisticamente significativo, nel comprensorio della Valle dell'Adige ed un difetto, statisticamente significativo, nei comprensori della Bassa Valsugana e della Valle di Sole.

Nelle femmine emerge un difetto di casi, statisticamente significativo, nel comprensorio della valle di Sole.

### Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	1,1	0,0




# Mesotelioma

ICD10 C45

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'(*)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	19	8	7	8
Numero casi / anno	4	2	4	4
% sul totale	0,3	0,1	0,4	0,6
Tasso grezzo	2,0	0,8	1,4	1,6
Tasso std (EUR)	1,6	0,5	1,1	0,9
Rischio cumulato (0-74)	0,2	0,0	0,1	0,1
Età media	64,7	73,6	69,3	72,6
Età mediana	66	73,5	70	74,5




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	14	73,7	5	62,5
Citologica	5	26,3	2	25,0
Clinica	0	0,0	1	12,5
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Neoplasie mesoteliali	19	100


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



(\*) Dati relativi al biennio 2005-2006; la classificazione dei dati del biennio 2003-2004 (ICD9) non permette di valutare questa specifica causa di morte

## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,5	10,3	10,2	9,1
Bassa Valsugana	0,5	3,9	3,6	2,3
Alta Valsugana	0,5	2,1	2,4	1,6
Valle dell'Adige	1,0	1,2	1,3	1,0
Valle di Non	0,3	1,3	1,4	1,2
Valle di Sole	0,0	0,0	0,0	0,0
Giudicarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Alto Garda	0,8	3,5	3,5	2,8
Vallagarina	1,3	3,0	3,1	2,7
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*


Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,3	1,9	2,1	2,2
Alta Valsugana	0,3	1,0	1,0	0,4
Valle dell'Adige	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle di Non	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle di Sole	0,0	0,0	0,0	0,0
Giudicarie	0,3	1,4	1,4	0,8
Alto Garda	0,5	2,2	2,3	1,3
Vallagarina	0,8	1,7	1,6	0,8
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
96,3	136,4	0,0




# Sarcoma di Kaposi

ICD10 C46

## Sintesi dei dati


Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'(*)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	12	8	-	1
Numero casi / anno	4	2	-	0
% sul totale	0,2	0,1	-	0,1
Tasso grezzo	1,2	0,8	-	0,2
Tasso std (EUR)	1,0	0,3	-	0,1
Rischio cumulato (0-74)	0,1	0,0	-	0,0
Età media	51,6	80,8	-	90
Età mediana	44	77	-	90




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	12	100,0	8	100,0
Citologica	0	0,0	0	0,0
Clinica	0	0,0	0	0,0
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



(\*) Dati relativi al biennio 2005-2006; la classificazione dei dati del biennio 2003-2004 (ICD9) non permette di valutare questa specifica causa di morte

## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Alta Valsugana	0,3	1,0	1,0	0,8
Valle dell'Adige	1,3	1,6	1,6	1,3
Valle di Non	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle di Sole	0,3	3,3	3,3	2,5
Giudicarie	0,5	2,8	3,1	2,0
Alto Garda	0,3	1,2	1,1	1,1
Vallagarina	0,5	1,2	1,2	1,0
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,3	2,6	2,8	1,2
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Alta Valsugana	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle dell'Adige	0,5	0,6	0,5	0,2
Valle di Non	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle di Sole	0,8	9,7	9,0	3,6
Giudicarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Alto Garda	0,5	2,2	2,2	0,9
Vallagarina	0,0	0,0	0,0	0,0
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Emerge un eccesso di casi, statisticamente significativo solo nei riguardi delle femmine, nel comprensorio della Valle di Sole.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	6,7	0,0



# Tessuti molli

ICD10 C47,49

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	41	44	9	18
Numero casi / anno	10	11	2	4
% sul totale	0,6	0,8	0,3	0,7
Tasso grezzo	4,2	4,3	0,9	1,8
Tasso std (EUR)	3,5	3,4	0,7	0,9
Rischio cumulato (0-74)	0,3	0,3	0,0	0,1
Età media	57,4	57,3	70,4	73,9
Età mediana	59	65	73	76,5

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**21**  
nuove persone malate di tumore dei tessuti molli

di cui

♀ 55% ♂ 45%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	38	92,7	39	88,6
Citologica	1	2,4	1	2,3
Clinica	2	4,9	4	9,1
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Tumori delle parti molli e sarcomi, NAS	32	41,6
Neoplasie miomatose	15	19,5
Neoplasie fibromatose	10	13,0
Neoplasie lipomatose	10	13,0
Altre morfologie	10	13,0


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,0	10,7	10,5	9,8
Primiero	0,3	5,1	5,7	4,8
Bassa Valsugana	0,5	3,9	4,0	3,4
Alta Valsugana	0,5	2,1	2,1	1,7
Valle dell'Adige	4,0	5,0	4,7	3,9
Valle di Non	1,3	6,7	6,5	6,5
Valle di Sole	0,8	10,0	8,9	7,2
Giudicarie	0,5	2,8	2,6	1,9
Alto Garda	0,8	3,5	3,3	2,5
Vallagarina	0,8	1,8	1,8	1,9
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,0	10,4	11,3	10,5
Primiero	0,3	4,9	5,0	2,8
Bassa Valsugana	0,5	3,7	3,6	5,3
Alta Valsugana	1,8	7,1	8,1	5,3
Valle dell'Adige	2,3	2,6	2,5	2,3
Valle di Non	0,8	3,9	4,0	3,3
Valle di Sole	0,3	3,2	3,4	3,0
Giudicarie	1,0	5,4	5,2	4,1
Alto Garda	2,0	8,8	8,4	4,7
Vallagarina	1,3	2,9	2,8	1,9
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
92,9	31,8	0,0





# Mammella femminile

ICD10 C50

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA	MORTALTA'
	Femmine	Femmine
Numero casi	1.482	364
Numero casi / anno	370	92
% sul totale	25,3	14,5
Tasso grezzo	145,9	35,8
Tasso std (EUR)	110,8	22,3
Rischio cumulato (0-74)	9,2	1,7
Età media	62,9	70,7
Età mediana	63	73

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**370**  
nuove persone malate di tumore della mammella


## Modalità di diagnosi

Fonte	Femmine	
	N	%
Istologica	1.384	93,4
Citologica	71	4,8
Clinica	18	1,2
Autoptica	1	0,1
Istologica su metastasi	0	0,0
DCO	8	0,5


## Morfologie

Istotipo	N	%
Duttale	1.037	74,4
Lobulare	207	14,9
Mucinoso	32	2,3
Altre morfologie	115	8,3
Carcinoma NAS	2	0,1


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio – Femmine

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	12,5	129,9	133,1	102,7
Primiero	5,3	103,2	99,2	74,3
Bassa Valsugana	21,5	160,1	153,3	115,9
Alta Valsugana	35,0	142,5	144,9	111,8
Valle dell'Adige	123,0	144,0	141,7	110,2
Valle di Non	27,5	144,3	143,1	110,4
Valle di Sole	14,0	181,3	185,0	143,7
Giudicarie	30,3	164,7	162,6	126,1
Alto Garda	32,0	140,6	140,6	103,0
Vallagarina	63,0	145,8	140,5	108,6
Fassa	6,5	138,7	155,5	109,2


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
98,3	24,6	0,5



# Cervice uterina

ICD10 C53

## Sintesi dei dati

Indicatori	<b>INCIDENZA</b>	<b>MORTALTA'</b>
	Femmine	Femmine
Numero casi	58	17
Numero casi / anno	14	4
% sul totale	1,0	0,7
Tasso grezzo	5,7	1,7
Tasso std (EUR)	4,6	1,0
Rischio cumulato (0-74)	0,4	0,1
Età media	58	66,1
Età mediana	55,5	76

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**14**  
nuove persone malate di tumore della cervice


## Modalità di diagnosi

Fonte	Femmine	
	N	%
Istologica	58	100,0
Citologica	0	0,0
Clinica	0	0,0
Autoptica	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0
DCO	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	47	81,0
Adenocarcinoma	10	17,2
Altre morfologie	1	1,7


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio — *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,8	7,8	7,1	7,1
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	1,0	7,4	6,6	5,5
Alta Valsugana	1,8	7,1	7,2	5,0
Valle dell'Adige	4,5	5,3	5,0	3,9
Valle di Non	0,8	3,9	4,1	3,3
Valle di Sole	0,3	3,2	3,6	2,5
Giudicarie	1,3	6,8	6,3	5,3
Alto Garda	2,3	9,9	10,2	9,4
Vallagarina	1,8	4,0	4,1	3,8
Fassa	0,3	5,3	4,9	5,3


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	29,3	0,0



# Corpo dell'utero

ICD10 C54

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA	MORTALTA'
	Femmine	Femmine
Numero casi	230	32
Numero casi / anno	58	8
% sul totale	3,9	1,3
Tasso grezzo	22,6	3,2
Tasso std (EUR)	17,6	1,9
Rischio cumulato (0-74)	1,5	0,2
Età media	63,8	72,4
Età mediana	64	72

OGNI ANNO

**3.140**

nuove persone malate di tumore

**58**

nuove persone malate di tumore del corpo dell'utero


## Modalità di diagnosi

Fonte	Femmine	
	N	%
Istologica	227	98,7
Citologica	1	0,4
Clinica	2	0,9
Autoptica	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0
DCO	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma	176	77,5
Altre morfologie	41	18,1
Carcinoma NAS	10	4,4


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio — *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,3	13,0	14,2	9,0
Primiero	0,5	9,8	10,3	7,9
Bassa Valsugana	3,5	26,1	25,1	18,5
Alta Valsugana	5,0	20,4	21,1	15,9
Valle dell'Adige	17,5	20,5	20,3	16,0
Valle di Non	4,3	22,3	20,8	15,6
Valle di Sole	2,5	32,4	33,2	26,1
Giudicarie	3,5	19,1	18,5	14,9
Alto Garda	6,8	29,7	29,7	22,2
Vallagarina	11,8	27,2	27,1	22,0
Fassa	1,0	21,3	22,5	20,1


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
99,1	13,9	0,0



# Ovaio

ICD10 C56

## Sintesi dei dati

Indicatori	<b>INCIDENZA</b>	<b>MORTALTA'</b>
	Femmine	Femmine
Numero casi	151	131
Numero casi / anno	38	32
% sul totale	2,6	5,2
Tasso grezzo	14,9	12,9
Tasso std (EUR)	10,7	7,8
Rischio cumulato (0-74)	0,8	0,7
Età media	64,2	72,4
Età mediana	66,5	74

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**38**  
nuove persone malate di tumore dell'ovaio


## Modalità di diagnosi

Fonte	Femmine	
	N	%
Istologica	119	78,7
Citologica	12	8,0
Clinica	15	10,0
Autoptica	0	0,0
Istologica su metastasi	5	3,3
DCO	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Neoplasie cistiche, mucinose e sierose	54	43,9
Adenocarcinoma	44	35,8
Altre morfologie	23	18,7
Carcinoma NAS	2	1,6


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio – Femmine

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,8	18,2	17,6	14,1
Primiero	1,3	24,6	25,1	20,7
Bassa Valsugana	2,3	16,8	14,9	10,9
Alta Valsugana	5,0	20,4	20,0	15,1
Valle dell'Adige	12,0	14,1	13,7	10,4
Valle di Non	1,5	7,9	7,3	4,6
Valle di Sole	0,8	9,7	10,2	8,0
Giudicarie	3,5	19,1	17,6	12,6
Alto Garda	2,0	8,8	9,4	6,8
Vallagarina	7,5	17,4	16,7	12,1
Fassa	0,3	5,3	7,7	3,3

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
90,0	87,3	0,0





# Prostata

ICD10 C61

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA	MORTALTA'
	Maschi	Maschi
Numero casi	1.060	295
Numero casi / anno	266	74
% sul totale	15,8	9,2
Tasso grezzo	109,2	30,4
Tasso std (EUR)	83,3	21,4
Rischio cumulato (0-74)	7,7	1,0
Età media	70,3	78,7
Età mediana	71	80




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi	
	N	%
Istologica	1.033	97,5
Citologica	3	0,3
Clinica	23	2,2
Autoptica	0	0,0
Istologica su metastasi	1	0,1
DCO	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma	1027	99,3
Altre morfologie	5	0,5
Carcinoma NAS	2	0,2


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio — Maschi

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	8,5	91,2	96,9	70,1
Primiero	6,0	123,0	120,9	88,4
Bassa Valsugana	9,0	70,7	69,2	49,5
Alta Valsugana	29,8	124,8	139,0	100,9
Valle dell'Adige	95,5	118,8	124,1	91,8
Valle di Non	18,3	97,3	94,0	68,7
Valle di Sole	12,5	166,7	168,1	121,8
Giudicarie	19,3	108,2	114,4	84,2
Alto Garda	26,5	123,4	126,5	95,8
Vallagarina	36,3	87,9	88,9	64,7
Fassa	3,5	76,1	93,9	70,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Il tasso di incidenza è oltre l'atteso, in modo statisticamente significativo, nei residenti in Valle di Sole ed inferiore all'atteso in modo statisticamente significativo nei residenti in Bassa Valsugana ed in Vallagarina.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
97,8	27,8	0,0



# Testicolo

ICD10 C62

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA	MORTALTA'
	Maschi	Maschi
Numero casi	80	4
Numero casi / anno	20	1
% sul totale	1,2	0,1
Tasso grezzo	8,2	0,4
Tasso std (EUR)	7,8	0,4
Rischio cumulato (0-74)	0,6	0,0
Età media	35,5	40,8
Età mediana	34	39,5

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**20**  
nuove persone malate di tumore del testicolo


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi	
	N	%
Istologica	79	98,8
Citologica	1	1,3
Clinica	0	0,0
Autoptica	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0
DCO	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Seminoma	50	63,3
Ca. Embrionale	16	20,3
Teratoma	9	11,4
Altre morfologie	3	3,8
Carcinoma NAS	1	1,3


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età




## Incidenza per comprensorio

### Dati di incidenza per comprensorio — *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,8	8,0	7,5	6,2
Primiero	0,5	10,3	11,1	10,8
Bassa Valsugana	0,5	3,9	4,0	4,2
Alta Valsugana	2,5	10,5	10,5	9,5
Valle dell'Adige	7,5	9,3	9,4	8,6
Valle di Non	1,3	6,7	7,2	6,5
Valle di Sole	0,5	6,7	5,9	5,3
Giudicarie	0,8	4,2	4,6	4,5
Alto Garda	2,0	9,3	10,0	9,4
Vallagarina	3,3	7,9	8,0	7,4
Fassa	0,5	10,9	10,4	10,8


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	5,0	0,0




# Rene e vie urinarie

ICD10 C64-66,68

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	209	109	85	59
Numero casi / anno	52	28	22	14
% sul totale	3,1	1,9	2,7	2,3
Tasso grezzo	21,5	10,7	8,8	5,8
Tasso std (EUR)	16,9	6,6	6,2	2,7
Rischio cumulato (0-74)	1,4	0,5	0,5	0,1
Età media	68,5	69,5	74	77,1
Età mediana	69	74	75	80




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	134	64,1	67	61,5
Citologica	39	18,7	16	14,7
Clinica	34	16,3	25	22,9
Autoptica	0	0,0	1	0,9
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	2	1,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Adenocarcinoma	158	78,2
A cellule transizionali	18	8,9
Altre morfologie	12	5,9
A cellule squamose	8	4,0
Carcinoma NAS	6	3,0


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,3	13,4	14,1	10,3
Primiero	1,8	35,9	34,2	26,8
Bassa Valsugana	3,3	25,5	26,6	21,1
Alta Valsugana	4,0	16,8	18,2	14,9
Valle dell'Adige	16,5	20,5	20,8	16,0
Valle di Non	3,8	20,0	19,3	14,2
Valle di Sole	1,5	20,0	19,1	16,3
Giudicarie	4,3	23,9	24,0	17,5
Alto Garda	5,5	25,6	25,3	19,7
Vallagarina	9,8	23,6	23,5	17,9
Fassa	0,8	16,3	24,1	17,6

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,3	2,6	1,8	0,7
Primiero	0,5	9,8	9,4	7,0
Bassa Valsugana	0,3	1,9	2,1	2,2
Alta Valsugana	2,8	11,2	11,2	7,9
Valle dell'Adige	9,5	11,1	10,9	7,0
Valle di Non	3,0	15,7	14,9	10,6
Valle di Sole	1,0	13,0	10,8	5,9
Giudicarie	1,8	9,5	8,9	4,9
Alto Garda	3,3	14,3	14,4	9,3
Vallagarina	4,5	10,4	9,4	5,7
Fassa	0,5	10,7	12,7	4,5


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
80,8	45,3	0,6



# Vescica

ICD10 C67

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	494	164	154	60
Numero casi / anno	124	42	38	16
% sul totale	7,4	2,8	4,8	2,4
Tasso grezzo	50,9	16,1	15,9	5,9
Tasso std (EUR)	39,5	10,0	11,6	2,6
Rischio cumulato (0-74)	3,2	0,8	0,7	0,1
Età media	69	70,8	76,8	80,2
Età mediana	70	73	77,5	82

OGNI ANNO

**3.140**

nuove persone malate di tumore

**166**

nuove persone malate di tumore della vescica

di cui

♀ 25% ♂ 75%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	475	96,2	146	89,0
Citologica	6	1,2	2	1,2
Clinica	9	1,8	13	7,9
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	4	0,8	3	1,8


## Morfologie

Istotipo	N	%
Cellule transizionali	585	94,2
Adenocarcinoma	13	2,2
Altre morfologie	23	3,7


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	5,0	53,6	54,7	42,0
Primiero	3,8	76,9	76,1	55,6
Bassa Valsugana	9,5	74,6	77,9	58,4
Alta Valsugana	11,8	49,3	53,7	42,3
Valle dell'Adige	39,8	49,4	49,6	37,2
Valle di Non	9,0	48,0	49,2	38,7
Valle di Sole	4,3	56,7	56,7	42,1
Giudicarie	8,3	46,4	44,4	34,2
Alto Garda	10,5	48,9	49,6	36,1
Vallagarina	19,3	46,7	47,6	36,7
Fassa	2,5	54,4	60,4	49,3

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	2,0	20,8	21,5	14,5
Primiero	1,0	19,7	18,6	12,4
Bassa Valsugana	3,3	24,2	22,0	13,6
Alta Valsugana	5,0	20,4	22,0	14,6
Valle dell'Adige	14,5	17,0	16,2	9,8
Valle di Non	2,5	13,1	12,9	10,7
Valle di Sole	1,5	19,4	18,5	10,0
Giudicarie	2,3	12,2	11,6	6,6
Alto Garda	3,0	13,2	13,1	7,9
Vallagarina	6,0	13,9	13,5	8,8
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
95,6	32,5	1,0






# Cervello

ICD10 C70-72

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	79	73	73	87
Numero casi / anno	20	18	18	22
% sul totale	1,2	1,2	2,3	3,5
Tasso grezzo	8,1	7,2	7,5	8,6
Tasso std (EUR)	7,0	6,1	6,1	5,6
Rischio cumulato (0-74)	0,6	0,5	0,5	0,5
Età media	58,7	56,8	63,6	68,4
Età mediana	61	63	66	72

OGNI ANNO




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	56	70,9	53	72,6
Citologica	0	0,0	0	0,0
Clinica	23	29,1	19	26,0
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	1	1,4


## Morfologie

Istotipo	N	%
Glioblastoma	65	59,6
Astrocitoma	22	20,2
Glioma	12	11,0
Oligodendroglioma	4	3,7
Altre morfologie	6	5,5


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,8	8,0	8,8	7,0
Primiero	0,3	5,1	5,4	4,5
Bassa Valsugana	1,5	11,8	12,2	10,0
Alta Valsugana	1,8	7,3	7,8	6,0
Valle dell'Adige	6,3	7,8	7,9	6,5
Valle di Non	1,8	9,3	9,8	7,5
Valle di Sole	0,8	10,0	10,3	11,2
Giudicarie	1,8	9,8	9,9	7,8
Alto Garda	1,0	4,7	4,8	4,4
Vallagarina	3,3	7,9	7,8	7,2
Fassa	0,8	16,3	14,5	16,7

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,8	7,8	7,9	7,1
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	1,3	9,3	9,9	9,9
Alta Valsugana	2,0	8,1	8,8	7,9
Valle dell'Adige	6,5	7,6	7,6	6,0
Valle di Non	2,0	10,5	10,9	10,2
Valle di Sole	0,3	3,2	3,1	1,3
Giudicarie	2,5	13,6	14,2	10,9
Alto Garda	1,0	4,4	4,7	3,7
Vallagarina	2,0	4,6	4,7	4,1
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
71,7	105,3	0,6



# Tiroide

ICD10 C73

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	46	157	9	6
Numero casi / anno	12	40	2	2
% sul totale	0,7	2,7	0,3	0,2
Tasso grezzo	4,7	15,5	0,9	0,6
Tasso std (EUR)	4,2	14,6	0,8	0,3
Rischio cumulato (0-74)	0,3	1,1	0,1	0,0
Età media	49,2	45,9	58,7	75,3
Età mediana	47	44	64	79,5

OGNI ANNO

**3.140**

nuove persone malate di tumore

**52**

nuove persone malate di tumore della tiroide

di cui

♀ 77% ♂ 23%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	37	80,4	125	79,6
Citologica	7	15,2	27	17,2
Clinica	1	2,2	5	3,2
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	1	2,2	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Squamocellulare	73	44,8
Adenocarcinoma	71	43,6
Altre morfologie	10	6,1
Carcinoma NAS	9	5,5


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,4	6,7	6,8
Primiero	0,3	5,1	4,7	4,8
Bassa Valsugana	0,3	2,0	1,7	1,8
Alta Valsugana	0,8	3,1	3,5	2,6
Valle dell'Adige	4,3	5,3	5,3	4,7
Valle di Non	1,8	9,3	9,4	8,6
Valle di Sole	0,5	6,7	6,0	6,2
Giudicarie	1,5	8,4	8,1	7,3
Alto Garda	0,0	0,0	0,0	0,0
Vallagarina	1,5	3,6	3,7	3,2
Fassa	0,3	5,4	4,9	4,1

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,3	2,6	2,4	2,1
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	2,3	16,8	16,7	15,9
Alta Valsugana	2,5	10,2	10,1	9,4
Valle dell'Adige	18,3	21,4	21,0	19,8
Valle di Non	3,0	15,7	15,8	15,5
Valle di Sole	1,3	16,2	17,0	16,4
Giudicarie	1,3	6,8	7,0	6,9
Alto Garda	3,0	13,2	12,9	11,9
Vallagarina	7,5	17,4	17,3	16,6
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra i comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
97,0	7,4	0,0




# Linfoma di Hodgkin

ICD10 C81

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	34	42	8	18
Numero casi / anno	8	10	2	4
% sul totale	0,5	0,7	0,3	0,7
Tasso grezzo	3,5	4,1	0,8	1,8
Tasso std (EUR)	3,1	3,9	0,6	0,9
Rischio cumulato (0-74)	0,2	0,3	0,0	0,0
Età media	50,9	44,7	79,1	72,7
Età mediana	46,5	37	80,5	77,5




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	32	94,1	36	85,7
Citologica	2	5,9	6	14,3
Clinica	0	0,0	0	0,0
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Sclerosi nodulare	32	47,1
Cellularità mista	18	26,5
Predominanza linfocitaria	4	5,9
Altre morfologie	1	1,5
Non specificato	13	19,1


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,0	0,0	0,0	0,0
Primiero	0,3	5,1	5,8	6,5
Bassa Valsugana	0,5	3,9	3,9	3,3
Alta Valsugana	0,8	3,1	3,2	2,6
Valle dell'Adige	3,5	4,4	4,4	4,0
Valle di Non	0,5	2,7	2,5	2,0
Valle di Sole	0,5	6,7	6,5	5,5
Giudicarie	0,8	4,2	3,9	3,1
Alto Garda	1,3	5,8	6,0	5,6
Vallagarina	0,3	0,6	0,6	0,5
Fassa	0,3	5,4	7,0	4,2

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,2	6,1	6,2
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	0,5	3,7	4,4	3,9
Alta Valsugana	0,8	3,1	3,0	2,1
Valle dell'Adige	4,0	4,7	4,6	4,3
Valle di Non	1,0	5,2	5,7	5,3
Valle di Sole	0,5	6,5	6,7	4,9
Giudicarie	1,0	5,4	5,2	4,2
Alto Garda	0,5	2,2	2,2	2,0
Vallagarina	1,8	4,0	4,5	4,7
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0


### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	34,2	0,0




# Linfoma non Hodgkin

ICD10 C82-85, C96

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	184	186	64	77
Numero casi / anno	46	46	16	20
% sul totale	2,7	3,2	2,0	3,1
Tasso grezzo	19,0	18,3	6,6	7,6
Tasso std (EUR)	15,2	11,8	5,2	3,8
Rischio cumulato (0-74)	1,2	0,9	0,3	0,2
Età media	64,8	67,7	70,7	74,6
Età mediana	68	71	74	78




## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	157	85,3	159	85,5
Citologica	22	12,0	23	12,4
Clinica	3	1,6	2	1,1
Autoptica	2	1,1	2	1,1
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Linfomi a cellule B mature	201	62,8
Linfomi linfoblastico a cellule "precursor"	28	8,8
Linfomi a cellule T e natural killer mature	3	0,9
Istocitosi maligna	1	0,3
Non specificato	87	27,2


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,5	16,1	16,8	14,5
Primiero	0,8	15,4	14,3	11,2
Bassa Valsugana	3,5	27,5	28,2	23,9
Alta Valsugana	4,5	18,9	19,8	15,9
Valle dell'Adige	15,0	18,7	19,0	14,7
Valle di Non	4,5	24,0	23,8	20,3
Valle di Sole	1,3	16,7	16,4	11,9
Giudicarie	2,5	14,1	13,1	10,2
Alto Garda	3,5	16,3	16,6	14,3
Vallagarina	8,8	21,2	20,3	15,5
Fassa	0,3	5,4	6,4	5,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,8	18,2	17,7	12,1
Primiero	0,5	9,8	8,1	3,2
Bassa Valsugana	3,3	24,2	19,2	11,8
Alta Valsugana	5,8	23,4	23,7	16,5
Valle dell'Adige	12,3	14,3	14,2	9,6
Valle di Non	3,3	17,1	15,9	9,2
Valle di Sole	0,5	6,5	6,4	4,3
Giudicarie	2,3	12,2	12,0	9,8
Alto Garda	4,5	19,8	19,7	12,6
Vallagarina	11,8	27,2	25,9	17,7
Fassa	0,8	16,0	23,3	8,6

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio




Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
98,6	38,1	0,0





# Mieloma multiplo

ICD10 C88-90

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	65	73	58	63
Numero casi / anno	16	18	14	16
% sul totale	1,0	1,2	1,8	2,5
Tasso grezzo	6,7	7,2	6,0	6,2
Tasso std (EUR)	5,1	4,1	4,2	3,1
Rischio cumulato (0-74)	0,4	0,3	0,2	0,2
Età media	70,3	73,4	76	76,4
Età mediana	72	75	77	77

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**34**  
nuove persone malate di  
mieloma multiplo

di cui

♀ 53% ♂ 47%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	47	72,3	37	50,7
Citologica	11	16,9	27	37,0
Clinica	7	10,8	9	12,3
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Mieloma multiplo	81	96,4
Plasmocitoma extramidi-dollare	2	2,4
Plasmocitoma, NAS (Mieloma monostotico)	1	1,2


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,4	5,5	3,3
Primiero	0,0	0,0	0,0	0,0
Bassa Valsugana	1,3	9,8	10,6	7,6
Alta Valsugana	2,3	9,4	10,6	8,1
Valle dell'Adige	4,5	5,6	5,5	4,4
Valle di Non	0,5	2,7	2,5	1,6
Valle di Sole	0,8	10,0	9,8	7,3
Giudicarie	0,8	4,2	4,1	3,7
Alto Garda	1,3	5,8	5,5	3,7
Vallagarina	3,5	8,5	8,3	6,0
Fassa	1,0	21,8	23,8	19,0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,3	13,0	12,4	7,7
Primiero	0,3	4,9	3,0	1,1
Bassa Valsugana	1,8	13,0	11,4	5,6
Alta Valsugana	1,5	6,1	6,4	3,5
Valle dell'Adige	6,0	7,0	6,9	3,8
Valle di Non	1,5	7,9	7,4	4,0
Valle di Sole	0,5	6,5	6,3	2,9
Giudicarie	1,0	5,4	4,5	1,9
Alto Garda	2,0	8,8	9,1	6,5
Vallagarina	2,5	5,8	5,8	3,9
Fassa	0,0	0,0	0,0	0,0

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
88,4	87,7	0,0



# Leucemie

ICD10 C91-95

## Sintesi dei dati

Indicatori	INCIDENZA		MORTALITA'	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Numero casi	133	133	81	92
Numero casi / anno	33	33	20	23
% sul totale	2,0	2,3	2,5	3,7
Tasso grezzo	13,7	13,1	8,3	9,1
Tasso std (EUR)	11,3	8,2	6,0	4,6
Rischio cumulato (0-74)	0,8	0,5	0,5	0,3
Età media	62,5	66,4	72,1	74,7
Età mediana	71	75	74	80

OGNI ANNO

**3.140**  
nuove persone malate di tumore

**66**  
nuove persone malate di leucemia

di cui

♀ 53% ♂ 47%


## Modalità di diagnosi

Fonte	Maschi		Femmine	
	N	%	N	%
Istologica	40	30,1	41	30,8
Citologica	93	69,9	92	69,2
Clinica	0	0,0	0	0,0
Autoptica	0	0,0	0	0,0
Istologica su metastasi	0	0,0	0	0,0
DCO	0	0,0	0	0,0


## Morfologie

Istotipo	N	%
Leucemia mieloide acuta	29	35,8
Leucemia linfatica cronica	19	23,5
Leucemia mieloide cronica	16	19,8
Leucemia linfatica acuta	15	18,5
Leucemia NAS	2	2,5


## Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età




## Tassi grezzi di incidenza specifici per età



## Distribuzione % dei decessi per fasce d'età



## Tassi grezzi di mortalità specifici per età



## Incidenza per comprensorio


### Dati di incidenza per comprensorio: *Maschi*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	0,5	5,4	5,0	5,0
Primiero	0,3	5,1	4,7	6,4
Bassa Valsugana	0,8	5,9	6,1	4,0
Alta Valsugana	3,5	14,7	16,2	12,1
Valle dell'Adige	14,0	17,4	17,7	14,5
Valle di Non	1	5,3	4,6	3,7
Valle di Sole	0,5	6,6	6,6	7,1
Giudicarie	4,0	22,4	23,2	19,2
Alto Garda	2,5	11,7	11,6	7,7
Vallagarina	6,3	15,2	14,6	12,8
Fassa	0	0	0	0

### Dati di incidenza per comprensorio: *Femmine*

Comprensorio	Casi anno	Tasso grezzo	Tasso std (ITA01)	Tasso std (EUR)
Fiemme	1,5	15,6	15,7	7,0
Primiero	0,3	4,9	5,0	5,1
Bassa Valsugana	1,3	9,3	7,8	8,4
Alta Valsugana	2,5	10,2	8,8	4,8
Valle dell'Adige	10,0	11,7	11,0	6,6
Valle di Non	1,5	7,9	7,4	5,4
Valle di Sole	1,0	13,0	11,0	6,2
Giudicarie	4,3	23,1	21,7	17,4
Alto Garda	2,8	12,1	12,2	9,7
Vallagarina	7,3	16,8	16,1	10,5
Fassa	0,8	16,0	18,9	12,7

### Tassi std (ITA 2001) di incidenza per comprensorio



Non emergono differenze statisticamente significative tra comprensori, sia per quanto riguarda i maschi, sia per quanto riguarda le femmine.

## Indicatori di qualità (%)

MV	M/I	DCO
100,0	65,0	0,0

## CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

---

### A. Fonti informative e qualità dei dati

La disponibilità di archivi sanitari automatizzati rappresenta una condizione importante ed indispensabile per l'istituzione ed il mantenimento di un Registro tumori di popolazione secondo i criteri di registrazione a cui questa esperienza fa riferimento (ed i cui dettagli sono riportati in precedente reportistica). Quanto maggiore è la loro qualità, in termini di completezza, accuratezza e riproducibilità, tanto maggiore è l'efficienza del sistema e minore il carico di lavoro per gli operatori addetti alla registrazione. Nel tempo la qualità e la disponibilità degli archivi sanitari di base è migliorata anche se va rafforzata la sensibilizzazione degli operatori e dei servizi all'utilizzo "di sistema" dei flussi informativi correnti.

Una "procedura automatica" di registrazione dei tumori non esclude comunque una fase di tipo "manuale" con controlli diretti a video oppure tramite la consultazione della documentazione clinica da parte di personale sanitario dedicato e specificamente formato. I controlli dei dati, nelle diverse fasi di definizione della casistica incidente, rappresentano un tempo-lavoro non piccolo che incide in modo rilevante sulla tempistica di produzione dei report di aggiornamento.

### B. Utilizzo pratico dei dati a livello locale

Al di là del potenziale input per l'attività di epidemiologia descrittiva nello specifico campo oncologico, l'operatività attuale del Registro tumori di popolazione della provincia di Trento consente di svolgere un'attività di *servizio* secondo i seguenti criteri:

- *risposte alle richieste di consulenza* sull'incidenza e la mortalità oncologica da parte di utenti interni ed esterni
- *interfaccia con i servizi di screening oncologico*: segnalazione dei casi per la pulizia delle liste di invito, supporto per il calcolo degli indicatori di esito;
- *interfaccia con i registri tumore d'organo operanti in provincia*, il registro tumori cutanei ed il registro del mesotelioma: controllo reciproco della completezza e dell'accuratezza informativa, raccolta, in riferimento al primo, di dati sull'estensione di malattia nei casi di melanoma, che non sono routinariamente raccolti dal registro di popolazione;

### C. Considerazioni in merito ai dati

#### 1. L'andamento temporale

Il numero assoluto di casi registrati mostra un incremento nel tempo che è più costante nei maschi. Al di là del fatto che nel periodo 1995-98 non era stata inclusa nella registrazione l'area del Primiero, si può ritenere che parte di questo incremento vada da un lato attribuita all'invecchiamento della popolazione e dall'altro, al consolidamento delle attività di screening organizzato (mammella in particolare). Il tasso di incidenza, grezzo e standardizzato, evidenzia per altro una riduzione nel tempo, più marcata nei maschi.

Andamento analogo è manifestato dalla mortalità dove, accanto ad un incremento in numero assoluto si registra una riduzione del tasso, grezzo e standardizzato, molto più evidente nei maschi.

Modificazioni dello stile di vita nei maschi, in particolare rispetto al fumo, nelle coorti più giovani, possono aver dato un contributo di rilievo sia sull'incidenza che sulla mortalità.

## 2. La qualità dei dati 2003-2006

### ***a. verifica microscopica***

La presenza di una conferma microscopica assicura che la patologia identificata dal Registro sia proprio un caso di tumore. In linea teorica questa conferma dovrebbe tendere al 100%. In realtà non in tutti i casi tumorali è necessario o opportuno procedere ad accertamenti diagnostici invasivi, basti pensare a quadri che arrivano alla diagnosi in fase avanzata, soprattutto in pazienti anziani. In questi casi la conferma del patologo non aggiungerebbe informazioni utili né per il trattamento né per la prognosi. Inoltre una quota di pazienti può aver avuto la conferma microscopica lontano dall'area di residenza, non rendendo queste informazioni disponibili al Registro;

La *percentuale di casi con verifica microscopica* risulta superiore a quella riferita agli ultimi dati del Pool AIRTum (dati 1998-2005); considerando tutta la casistica con esclusione delle forme cutanee non melanoma, la % di casi con verifica microscopica passa dall'84,3% del periodo 1998-2002 all'89,7% (90% nei maschi e 89,4% nelle femmine).

### ***b. peso dei DCO***

La *percentuale di DCO della casistica trentina 2003-2006* è sovrapponibile a quella riferita agli ultimi dati del pool AIRTum (dati 1998-2005). considerando tutta la casistica con esclusione delle forme cutanee non melanoma, la % di DCO passa dall'1,4% del periodo 1998-2002 allo 0,9% (0,7% nei maschi e 1,3% nelle femmine).

### ***c. Rapporto mortalità/incidenza***

Il *rapporto mortalità/incidenza della casistica trentina 2003-2006* è aumentato rispetto al precedente periodo 1998-2002 ed appare di poco superiore rispetto agli ultimi dati del pool AIRTum (dati 1998-2005).

## 3. L'incidenza 2003-2006

Nei maschi sono registrati 1.420 casi/anno (1.675 casi/anno considerando anche le forme cutanee non melanoma); nelle femmine sono registrati 1.218 casi/anni (1.463 casi/anno considerando anche le forme cutanee non melanoma).

Il **tasso di incidenza** standardizzato sulla popolazione europea rispetto al quadriennio 1999-2002 si riduce in entrambi i sessi (soprattutto nei maschi); sia l'incidenza nei maschi, sia l'incidenza nelle femmine (per tutte le sedi con inclusione o meno delle forme cutanee non melanoma) risulta inferiore a quella riferita agli ultimi dati del pool AIRTum (dati 1998-2005).

L'**età alla diagnosi** è una variabile che si correla in modo rilevante con l'incidenza. Infatti il 77,5% dei casi incidenti nei maschi e il 69,8% nelle femmine si registra oltre i 60 anni. Il peso % della casistica over 64, rispetto al periodo 1998-2002, risulta immodificata nei maschi, mentre nelle femmine si riduce, passando dal 71,4% al 69,8%.

Le forme infantili (0-14 anni) risultano meno frequenti (46 vs. 57 casi nel periodo 1998-2002).

**Le prime 5 sedi per frequenza**, escludendo i tumori della pelle non melanoma, sono rappresentate nel periodo 2003-2006, tra i *maschi*, da:

Prostata (19%), Colon-retto (13%), Polmone (13%), Vescica (9%) e Fegato (6%). Queste 5 sedi rappresentano il 60% della casistica e tale quadro mostra una certa sovrapposizione con i dati del pool AIRTum per il periodo 2005-2007.

Nelle *femmine*, le prime 5 sedi per frequenza nel periodo 2003-2006, sono rappresentate, escludendo i tumori della pelle non melanoma, da:

Mammella (30%), Colon-retto (12%), Polmone (5%), Corpo Utero (5%), Stomaco (4%). Queste 5 sedi rappresentano il 56% della casistica ed il quadro mostra una quasi completa corrispondenza con i dati del pool AIRTum per il periodo 2005-2007.

#### 4. La distribuzione per comprensorio

Per il complesso delle sedi di malattia l'incidenza nei singoli comprensori non risulta significativamente diversa da quella registrata a livello provinciale.

L'analisi della *distribuzione comprensoriale* per singola sede evidenzia solo minime variazioni statisticamente significative, in particolare nei maschi si registra:

- un eccesso per i tumori non melanomatosi della pelle nel comprensorio della Valle dell'Adige
- un eccesso per le neoplasie della prostata nel comprensorio della Valle di Sole

Nelle femmine si registra:

- un eccesso per le neoplasie dello stomaco nel comprensorio delle Giudicarie
- un eccesso per i sarcomi di Kaposi nel comprensorio della Valle di Sole

#### 5. Il raffronto con i dati del pool AIRTum 1998-2005 per l'incidenza e la mortalità

Le sedi per cui *l'incidenza della Provincia* di Trento è *maggiore* rispetto al Pool AIRTum sono le seguenti:

- per i maschi:
  - Capo-collo
  - Esofago
  - Fegato
  - Osso
  - Sarcomi dei tessuti molli
  - Testicolo
- per le femmine:
  - Capo-collo
  - Esofago
  - Colecisti e vie biliari
  - Cute non melanomi
  - Sarcoma di Kaposi
  - Sarcomi dei Tessuti molli
  - Mammella
  - Vescica
  - Linfoma di Hodgkin
  - Leucemie

Sinteticamente si conferma il divario con il dato nazionale per quanto riguarda le forme del capo collo e dell'esofago nei maschi anche se va registrata una riduzione del rapporto tra tassi provinciali e tassi del pool AIRTum, rispetto al periodo 1998-2002 (possibile effetto coorte).

Nelle femmine le differenze con i tassi AIRTum, rispetto alle sedi dove il tasso provinciale è maggiore, sono meno accentuate rispetto ai maschi.

L'incremento dell'incidenza dei tumori della mammella femminile, rispetto ai valori del pool AIRTum, va interpretato alla luce dei dati di attività delle screening mammografico organizzato, i cui dati, come atteso, forniscono un impatto maggiore rispetto al precedente quadriennio.

Le sedi per cui la *mortalità della Provincia di Trento* è *maggiore* rispetto al Pool AIRTum sono le seguenti:

- per i maschi:
  - Capo-collo
  - Esofago
  - Fegato
  - Colecisti e vie biliari
  - Prostata
  - Mieloma
  
- per le femmine:
  - Esofago
  - Colecisti e vie biliari
  - Polmone
  - Sarcomi dei Tessuti molli
  - Corpo Utero
  - Ovaio
  - Rene e vie urinarie
  - Vescica
  - Cerebrali
  - Linfoma di Hodgkin
  - Mieloma


Sinteticamente si conferma il divario col dato nazionale per quanto riguarda le forme del capo collo e dell'esofago sia nei maschi che nelle femmine, anche se si registra una riduzione nel tempo del differenziale tra i tassi provinciali e i tassi del pool AIRTum. Nelle femmine le differenze con i tassi AIRTum, rispetto alle sedi dove la mortalità provinciale è maggiore, sono meno accentuate rispetto ai maschi.



## D. Criticità

Le principali criticità, inerenti l'attività di registrazione dei tumori e condivise per altro dalla gran parte dei registri tumore italiani, sono le seguenti:

- **il tempo tra diagnosi evento e raccolta/controllo del dato/report dei risultati:** si aggira attualmente sui 6 anni, registrando un allungamento dei tempi rispetto alle precedenti reportistiche; su questo ritardo incidono problemi di natura amministrativa (rinnovo convenzione con INSIEL di Udine) ma anche problemi organizzativi e di disponibilità di personale,
- **il controllo dei dati e la definizione dei casi incidenti** richiede un tempo adeguato che l'informatica certamente riduce ma non annulla, considerata la necessità di valutare in modo preciso non solo i casi "non accettati direttamente" dal gestionale del registro, ma anche parte di quelli accettati direttamente,
- **il turnover del personale:** il trasferimento ad altri servizi di personale medico e statistico formato e non sostituito ha inciso in modo rilevante, negli ultimi anni, sul rallentamento dell'attività, facendo emergere la necessità di attuare percorsi di formazione, entro e fuori l'attività istituzionale, per altri operatori del servizio in precedenza non coinvolti nell'attività di registrazione dei tumori,
- **il tempo da dedicare all'attività routinaria di registrazione** riduce il tempo e le opportunità per effettuare valutazioni più approfondite e raffinate, utili sia sul piano della valutazione della gestione dei casi che sull'attività di ricerca clinica-epidemiologica vera e propria,
- **il tema delle risorse** rappresenta il problema strutturale dominante, pur in se non nuovo ed anche alla luce della variabilità della dotazione di organico dei registri tumore italiani, come rappresentato di seguito



Fonte: [www.registri-tumore.it](http://www.registri-tumore.it)

## E. Prospettive

L'attività routinaria di registrazione dei tumori dovrebbe costituire il presupposto per impostare un quadro di riferimento, strutturale e operativo, relativo ad una epidemiologia oncologica non episodica od occasionale ma di sistema, con una serie di azioni che vadano oltre la esclusiva fase dell'accertamento e della registrazione dei casi incidenti e che comprendano anche:

- la valutazione della diagnosi,
- la caratterizzazione clinico-biologica dei casi,
- la valutazione della completezza e la qualità della stadiazione,
- la valutazione dell'appropriatezza delle procedure terapeutiche e la sua variabilità in relazione alle caratteristiche del paziente, della malattia e del luogo di trattamento,
- la valutazione della sopravvivenza, sul complesso delle sedi e tenendo conto delle caratteristiche del paziente, della malattia e del luogo di trattamento,
- la valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione primaria e secondaria,
- l'attuazione di indagini di epidemiologia analitica per la valutazione dei rischi individuali e/o ambientali,
- la valutazione del peso e delle caratteristiche della casistica trattata al di fuori delle strutture sanitari provinciali

Questo prefigurerebbe un'attività di registrazione ed analisi dei dati di incidenza e di mortalità per tumore strettamente integrata con il mondo clinico ed in particolare, per quanto riguarda la realtà della provincia di Trento, con il Dipartimento di Oncologia, per assicurare l'insieme del patrimonio informativo utile a definire:

- il gettito dei casi
- il carico di pazienti esistente
- le loro caratteristiche inerenti alle necessità di trattamento
- la qualità delle cure
- l'evoluzione a distanza
- le necessità assistenziali
- la programmazione, la descrizione e la valutazione dell'attività nel suo complesso, dal profilo preventivo a quello assistenziale.

Questa nuova vision sul ruolo dei registri tumore, per altro da tempo prefigurata dall'*European Network of Cancer Registries* e dalla stessa AIRTum, richiede un evidente quanto non ulteriormente differibile ripensamento sulle necessità operative di una struttura di questo tipo.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

---

- AIRTum Working Group, I tumori in Italia – Rapporto 2006. Incidenza, mortalità e stime, *Epidemiol. Prev.* Anno 30 (1) gennaio-febbraio 2006 supplemento 2
- AIRTum-Working Group. I nuovi dati di incidenza e mortalità. Periodo 2003-2005. *Epidemiologia e Prevenzione*, 33 (1-2), 2009 Suppl. 2.
- AIRTum-Working Group. I Tumori in Italia – Rapporto 2006. *Epidemiologia e Prevenzione*, 30 (1), 2006 Suppl. 2.
- AIRTum-Working Group. I Tumori in Italia – Rapporto 2009. *Epidemiologia e Prevenzione*, 33 (4-5), 2009 Suppl. 1.
- Associazione Italiana Registri Tumori: <http://www.registri-tumori.it/cms/>
- Bonadonna G, Robustelli Della Cuna G, Valagussa P (2007), *Medicina oncologica*. Ottava edizione, Elsevier Masson, Milano
- Crosignani P, Nesti M, Vercelli M, De Lisi V, Mangone L, Falcini F et al. Utilization des registres du cancer pour la surveillance des tumeurs professionnelles. In XXVI<sup>o</sup> Reunion du groupe pour l'epidemiologie et l'enregistrement du cancer dans le pays de langue latine. Neuchatel, 24-25 Mai 2001
- Faggiano F, Zanetti R., Costa G, Cancer risk and social inequalities in Italy. *J.Epidemiol. Commun.Health*, 1994, 48:447-452
- Fay MP, Feuer EJ, Confidence interval for directly standardized rates: a method based on the gamma distribution, *Statistic in Medicine*, Vol 16. 791-801 (1997)
- Federico M, Rashid I, Artioli ME, e al. (2006) I tumori in provincia di Modena nel 2004, Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, Modena
- International Agency for Research on Cancer: <http://www.iarc.fr/>
- Jensen OM, Parkin DM, Naclennan R, Muir CS, Skeet RG (1991), *Cancer Registration: Principles and Methods*, IARC Scientific Publications No. 95, International Agency for Cancer Research, Lyon, France
- Little J, *Epidemiology of childhood cancer*. IARC Sci.Pub n. 149, IARC, 1999 Lion –France
- Osservatorio Epidemiologico: Rapporto sull'incidenza dei tumori in provincia di Trento 1995-1998. APSS – Rapporto interno, Trento, 2003
- Osservatorio Epidemiologico: Rapporto sull'incidenza dei tumori in provincia di Trento 1999-2002. APSS – Rapporto interno, Trento, 2007
- Osservatorio Epidemiologico: Rapporto sulla fattibilità del Registro Tumori. APSS – Rapporto interno, Trento, 2001
- Parkin DM, Chen VW, Ferlay J, Galceran J, Storm HH, Whelan SL, (1994), *Comparability and Quality Control in Cancer Registration*, IARC Technical Report No. 19, International Agency for Cancer Research, Lyon, France
- Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Teppo L, Thomas DB (2002), *Cancer Incidence in Five Continents. Volume VIII*, IARC Scientific Publications No. 155, International Agency for Cancer Research, Lyon, France
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Agenzia Regionale della Sanità (2002), *Registro Tumori Regionale. Dati di incidenza 1995-1998*,
- Tomatis L. *Cancer: Causes and control*. IARC, Sci Pub. 100, Lyon, 1990
- Zanetti R, Gafà L, Pannelli F, Conti E, Rosso S (2002), *Il cancro in Italia. I dati di incidenza dei Registri Tumori. Volume terzo:1993-1998*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma
- Zanetti R, Rosso S, Riuscirà l'epidemiologia a salvare i registri tumori? *Epidemiol Prev* 2002; 26 (4), 198-202

## APPENDICE

---

Tabella 1	Provincia. Casi incidenti per classe d'età e sede. Maschi
Tabella 2	Provincia. Casi incidenti per classe d'età e sede. Femmine
Tabella 3	Provincia. Tassi grezzi di incidenza specifici per età e sede. Maschi
Tabella 4	Provincia. Tassi grezzi di incidenza specifici per età e sede. Femmine
Tabella 5	Provincia. Tassi standardizzati di incidenza, rischio cumulato, % sul totale specifici per sede. Maschi
Tabella 6	Provincia. Tassi standardizzati di incidenza, rischio cumulato, % sul totale specifici per sede. Femmine
Tabella 7	Tassi di incidenza per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea per sede. Confronti regionali. Maschi
Tabella 8	Tassi di incidenza per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea per sede. Confronti regionali. Femmine
Tabella 9	Valle di Fiemme. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 10	Valle di Fiemme. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 11	Primiero. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 12	Primiero. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 13	Bassa Valsugana e Tesino. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 14	Bassa Valsugana e Tesino. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 15	Alta Valsugana. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 16	Alta Valsugana. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 17	Valle dell'Adige. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 18	Valle dell'Adige. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 19	Valle di Non. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 20	Valle di Non. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 21	Valle di Sole. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 22	Valle di Sole. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
Tabella 23	Giudicarie. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
Tabella 24	Giudicarie. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine

- Tabella 25 Alto Garda e Ledro. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
- Tabella 26 Alto Garda e Ledro. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
- Tabella 27 Vallagarina. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
- Tabella 28 Vallagarina. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
- Tabella 29 Ladino di Fassa. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Maschi
- Tabella 30 Ladino di Fassa. Cassi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza per sede. Femmine
- Tabella 31 Provincia. Mortalità per classe d'età e sede. Maschi
- Tabella 32 Provincia. Mortalità per classe d'età e sede. Femmine
- Tabella 33 Provincia. Tassi grezzi di mortalità specifici per età e sede. Maschi
- Tabella 34 Provincia. Tassi grezzi di mortalità specifici per età e sede. Femmine
- Tabella 35 Provincia. Tassi standardizzati di mortalità, rischio cumulato, % sul totale specifici per sede. Maschi
- Tabella 36 Provincia. Tassi standardizzati di mortalità, rischio cumulato, % sul totale specifici per sede. Femmine

**Tabella 1: Provincia di Trento. Casi incidenti per classi d'età e sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	4	3	7	6	32	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	7	6	3	4	1	36	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	1	1	2	11	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	8	8	8	8	6	11	1	64	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	5	7	7	1	2	2	2	40	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	2	3	1	0	12	C11
Ipotaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	10	8	6	3	4	1	0	42	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	2	0	2	2	0	14	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	19	21	15	15	21	17	7	124	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	11	18	32	40	45	53	39	23	279	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	6	6	3	0	27	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	26	32	55	73	75	56	66	30	428	C18
Retto	0	0	0	0	2	1	0	1	5	7	18	38	40	53	61	59	31	10	326	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	16	21	37	51	54	63	31	11	296	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	9	5	6	15	16	6	61	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8	17	23	35	23	20	16	9	164	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	0	1	9	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	12	17	16	22	17	5	3	120	C32
Polmone	0	0	0	0	0	1	0	4	5	16	32	62	89	111	128	141	101	41	731	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	4	0	10	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	3	2	1	0	19	C45
Ossso	0	0	3	0	0	1	2	1	1	1	1	0	2	1	0	1	1	0	15	C40-C41
Tessuti molli	0	1	0	1	0	0	2	3	1	5	2	5	3	6	2	1	7	1	41	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	12	C46
Pelle, melanomi	0	0	1	1	1	4	3	2	10	5	16	8	11	18	11	16	4	3	114	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	4	6	7	21	23	47	72	89	110	143	154	149	122	77	1024	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	9	C50
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	83	146	215	243	205	106	31	1060	C61
Testicolo	0	0	0	1	7	18	16	14	13	4	6	0	0	0	0	0	1	0	80	C62
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	2	4	0	2	15	C60
Altri genitali maschili	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	5	C63
Vescica	0	0	0	0	0	2	2	5	8	8	24	46	71	75	80	80	60	33	494	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	1	0	0	0	3	4	9	12	13	30	36	32	29	26	14	209	C64-C66,C68
Occhio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	9	C69
Encefalo e altro SNC	1	2	0	0	0	0	0	0	4	3	10	6	12	9	9	9	3	3	79	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	3	3	3	5	6	6	5	2	4	2	2	3	1	1	46	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	2	1	1	5	1	4	3	2	2	0	2	4	4	2	0	34	C81
Linfoma non Hodgkin	0	1	0	1	3	0	1	8	4	14	15	14	15	25	26	25	21	11	184	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	9	10	7	13	10	5	65	C88-C90
Leucemia linfatica	4	3	3	1	1	0	1	2	1	1	2	4	4	5	8	4	7	6	57	C91
Leucemia mieloida	0	1	0	2	1	0	1	1	2	3	3	3	7	6	9	17	8	4	68	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	C93
Altre leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	C94
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	1	0	1	1	6	24	8	16	24	27	35	43	38	24	225	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>174</b>	<b>302</b>	<b>470</b>	<b>714</b>	<b>889</b>	<b>943</b>	<b>937</b>	<b>662</b>	<b>292</b>	<b>5677</b>	ALLB
Tutte le sedi	6	9	7	10	29	38	51	90	115	221	374	559	824	1032	1097	1086	784	369	6701	ALLT

**Tabella 2: Provincia di Trento. Casi incidenti per classi d'età e sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	7	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	0	2	1	10	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	6	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	6	3	21	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	9	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	5	C11
Ipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	3	4	5	4	23	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	1	1	5	1	8	8	6	12	9	38	45	43	34	211	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	5	2	20	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6	10	20	38	46	61	66	68	55	377	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	15	15	28	32	27	31	23	16	194	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	11	16	18	17	11	83	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	11	14	17	23	20	100	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	4	9	16	18	30	35	28	37	186	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	4	1	1	0	14	C32
Polmone	0	0	0	0	1	0	0	2	4	9	13	19	30	20	41	32	46	26	243	C33-C34
Altri organi toracici	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	6	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	2	8	C45
Ossso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	C40-C41
Tessuti molli	1	1	0	1	2	2	1	5	1	3	2	0	3	2	7	5	5	3	44	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	8	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	3	3	4	6	9	10	5	11	8	8	12	6	7	11	5	108	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	1	3	21	35	37	59	59	61	98	87	102	139	154	129	985	C44
Mammella	0	0	0	0	0	1	19	50	94	151	145	162	173	169	146	166	120	86	1482	C50
Utero, INAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	C55
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	9	5	6	2	5	4	6	1	58	C53
Utero, corpo	0	0	0	1	0	0	2	2	6	13	31	34	30	37	24	23	20	7	230	C54
Ovaio	0	0	1	1	2	2	4	4	3	12	14	13	17	13	13	18	22	12	151	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	1	1	1	1	5	6	3	7	13	9	16	14	15	14	106	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	13	10	14	18	23	32	24	19	164	C67
Rene, vie urinarie	2	1	0	0	0	1	0	3	1	2	5	7	10	12	11	20	20	14	109	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	7	C69
Encefalo e altro SNC	1	1	1	3	2	0	2	2	5	4	4	6	10	11	10	7	3	1	73	C70-C72
Tiroide	0	0	1	1	4	8	22	20	24	21	13	17	8	10	2	3	3	0	157	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	2	3	2	7	3	7	0	1	3	1	2	2	2	2	4	1	42	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	1	3	1	4	5	9	4	10	13	14	23	17	32	30	20	186	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	5	5	14	14	8	16	73	C88-C90
Leucemia linfatica	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	6	11	12	9	55	C91
Leucemia mieloide	1	0	1	0	0	0	3	3	3	2	2	4	3	5	10	12	12	8	69	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	C93
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	15	7	11	20	30	49	61	199	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>132</b>	<b>186</b>	<b>284</b>	<b>335</b>	<b>393</b>	<b>474</b>	<b>510</b>	<b>580</b>	<b>670</b>	<b>645</b>	<b>497</b>	<b>4869</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	14	4	6	15	22	35	92	167	223	343	394	454	572	597	682	809	799	626	5854	ALLT

**Tabella 3: Provincia di Trento. Tassi grezzi di incidenza (per 100.000) specifici per età e sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,6	12,9	6,4	10,4	9,7	33,7	55,3	3,3	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1,5	6,3	12,9	15	15,7	9,7	19,3	9,2	3,7	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	1,5	4,8	3,7	0	0	3,2	4,8	18,4	1,1	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	1,3	1,2	2,4	2,8	12	12,7	14,7	17,1	20,9	19,5	53	9,2	6,6	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,7	10,5	7,9	12,9	15	2,6	6,5	9,6	18,4	4,1	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	2,8	0	1,6	0	2,1	5,2	9,7	4,8	0	1,2	C11
Ipopofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	4,2	9	15,9	14,7	12,9	7,8	13	4,8	0	4,3	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	4,2	3	1,6	1,8	4,3	0	6,5	9,6	0	1,4	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	4,2	7,5	30,1	38,6	32,2	39,2	68,2	81,9	64,5	12,8	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	2,3	6	15,2	16,5	28,6	58,8	85,7	117,5	172	188	211,9	28,8	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	4,8	3,7	8,6	15,7	19,5	14,5	0	2,8	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	1,3	3,5	3,6	11,1	39	50,8	101,1	156,5	195,9	181,7	318,1	276,4	44,1	C18
Retto	0	0	0	0	3,9	1,6	0	1,2	6	9,7	27	60,3	73,5	113,6	159,3	191,5	149,4	92,1	33,6	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	1,2	3,6	11,1	24	33,3	68	109,3	141	204,5	149,4	101,4	30,5	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	2,8	0	1,6	16,5	10,7	15,7	48,7	77,1	55,3	6,3	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	1,9	0	0	2,3	2,4	11,1	12	27	42,3	75	60,1	64,9	77,1	82,9	16,9	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	5,5	2,1	5,2	0	0	9,2	0,9	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,1	30	19	31,2	34,3	57,5	55,2	24,1	27,6	12,4	C32
Polmone	0	0	0	0	0	1,6	0	4,6	6	22,1	48	98,3	163,6	237,9	334,3	457,6	486,8	377,8	75,3	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	1,5	0	1,8	0	2,6	3,2	19,3	0	1,0	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,5	4,8	5,5	10,7	7,8	6,5	4,8	0	2,0	C45
Osso	0	0	6	0	0	1,6	2,6	1,2	1,2	1,4	1,5	0	3,7	2,1	0	3,2	4,8	0	1,5	C40-C41
Tessuti molli	0	1,9	0	2,1	1,9	0	2,6	3,5	1,2	6,9	3	7,9	5,5	12,9	5,2	3,2	33,7	9,2	4,2	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	2,6	3,5	1,2	1,4	0	0	0	4,3	5,2	3,2	0	0	1,2	C46
Pelle, melanomi	0	0	2	2,1	1,9	6,2	3,8	2,3	12,1	6,9	24	12,7	20,2	38,6	28,7	51,9	19,3	27,6	11,7	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	7,8	9,3	8,9	24,3	27,8	65,1	107,9	141,2	202,2	306,5	402,2	483,6	588,1	709,5	105,5	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0	1,6	1,8	2,1	7,8	3,2	4,8	0	0,9	C50
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,3	37,5	131,7	268,3	460,9	634,6	665,3	510,9	285,6	109,2	C61
Testicolo	0	0	0	2,1	13,6	28	20,4	16,2	15,7	5,5	9	0	0	0	0	0	4,8	0	8,2	C62
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,4	1,5	0	3,7	4,3	5,2	13	0	18,4	1,5	C60
Altri genitali maschili	0	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	2,1	2,6	0	4,8	0	0,5	C63
Vescica	0	0	0	0	0	3,1	2,6	5,8	9,7	11,1	36	73	130,5	160,8	208,9	259,6	289,2	304,1	50,9	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	2,1	0	0	0	3,5	4,8	12,5	18	20,6	55,1	77,2	83,6	94,1	125,3	129	21,5	C64-C66,C68
Occhio	1,9	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,4	0	0	0	2,1	2,6	3,2	9,6	9,2	0,9	C69
Encefalo e altro SNC	1,9	3,9	0	0	3,9	0	3,8	3,5	4,8	4,2	15	9,5	22,1	19,3	23,5	29,2	14,5	27,6	8,1	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	5,8	4,7	3,8	5,8	7,2	8,3	7,5	3,2	7,4	4,3	5,2	9,7	4,8	9,2	4,7	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,5	0	0	0	0	0	4,8	0	0,3	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	4,1	3,9	1,6	6,4	1,2	4,8	4,2	3	3,2	0	4,3	10,4	13	9,6	0	3,5	C81
Linfoma non Hodgkin	0	1,9	0	2,1	5,8	0	1,3	9,3	4,8	19,4	22,5	22,2	27,6	53,6	67,9	81,1	101,2	101,4	19,0	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	2,8	3	9,5	16,5	21,4	18,3	42,2	48,2	46,1	6,7	C88-C90
Leucemia linfatica	7,5	5,8	6	2,1	1,9	0	1,3	2,3	1,2	1,4	3	6,3	7,4	10,7	20,9	13	33,7	55,3	5,9	C91
Leucemia mieloida	0	1,9	0	4,1	1,9	0	1,3	1,2	2,4	4,2	4,5	4,8	12,9	12,9	23,5	55,2	38,6	36,9	7,0	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	4,8	0	0,2	C93
Altre leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	3,2	0	0	0,2	C94
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	3,2	9,6	0	0,4	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	1,9	0	1,3	1,2	1,2	8,3	12	25,4	44,1	57,9	91,4	139,5	183,2	221,1	23,2	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>11,3</b>	<b>17,4</b>	<b>13,9</b>	<b>20,7</b>	<b>48,7</b>	<b>49,8</b>	<b>56,2</b>	<b>80</b>	<b>111,1</b>	<b>240,9</b>	<b>452,8</b>	<b>745,5</b>	<b>1312,2</b>	<b>1905,7</b>	<b>2462,8</b>	<b>3040,9</b>	<b>3191</b>	<b>2691</b>	<b>585,1</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>11,3</b>	<b>17,4</b>	<b>13,9</b>	<b>20,7</b>	<b>56,5</b>	<b>59,1</b>	<b>65,1</b>	<b>104,4</b>	<b>138,9</b>	<b>305,9</b>	<b>560,7</b>	<b>886,7</b>	<b>1514,3</b>	<b>2212,3</b>	<b>2865</b>	<b>3524,4</b>	<b>3779</b>	<b>3400</b>	<b>690,6</b>	<b>ALLT</b>



**Tabella 4: Provincia di Trento. Tassi grezzi di incidenza (per 100.000) specifici per età e sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10		
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	C00	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	C01-C02	
Ghiandole salivari	0	0	0	0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	C07-C08	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	C03-C06	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,8	C09-C10	
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	C11	
Ipotaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	C12-C13	
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,8	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,1	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,1	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,6	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,8	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,2	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,0	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	C37-C39
Mesoteloma	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,9	C40-C41
Ossso	2,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	C47-C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,6	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,0	C50
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,9	C55
Utero, service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	C50
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3	C55
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	C53
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,1	C54
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,9	C56
Rene, vie urinarie	4,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,3	C51-C52, C57
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,1	C67
Encefalo e altro SNC	2,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,7	C64-C66, C68
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	C69
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,2	C70-C72
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,5	C73
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	C74-C75
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	C81
Leucemia linfatica	14,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,3	C82-C85, C96
Leucemia mieloida	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,2	C88-C90
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,4	C91
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,8	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	C93
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>28,1</b>	<b>8,1</b>	<b>12,6</b>	<b>32,9</b>	<b>42,6</b>	<b>51,1</b>	<b>93,5</b>	<b>160,7</b>	<b>234,3</b>	<b>410,1</b>	<b>523,9</b>	<b>638,6</b>	<b>826,8</b>	<b>968,1</b>	<b>1180,5</b>	<b>1412,3</b>	<b>1586,1</b>	<b>1572,2</b>	<b>479,4</b>	<b>ALLB</b>		
<b>Tutte le sedi</b>	<b>28,1</b>	<b>8,1</b>	<b>12,6</b>	<b>32,9</b>	<b>44,6</b>	<b>55,9</b>	<b>121,1</b>	<b>203,3</b>	<b>280,9</b>	<b>495,3</b>	<b>616,2</b>	<b>737,8</b>	<b>997,7</b>	<b>1133,2</b>	<b>1388,1</b>	<b>1705,3</b>	<b>1964,8</b>	<b>1980,2</b>	<b>576,4</b>	<b>ALLT</b>		

**Tabella 5: Provincia di Trento. Tassi standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato e proporzione sul totale specifici per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

<b>SEDE</b>	<b>Mondo</b>	<b>Europa 99-02</b>	<b>Europa 03-06</b>	<b>Cum 74</b>	<b>%</b>	<b>ICD10</b>
Labbro	1,6	2,4	2,5	0,2	0,5	C00
Lingua	2,1	3,2	3	0,3	0,5	C01-C02
Ghiandole salivari	0,6	1,1	1	0,1	0,2	C07-C08
Bocca	3,6	6,0	5,2	0,4	1,0	C03-C06
Orofaringe	2,6	2,3	3,6	0,3	0,6	C09-C10
Rinofaringe	0,7	0,9	0,9	0,1	0,2	C11
Ipopfaringe	2,7	2,3	3,7	0,3	0,6	C12-C13
Faringe, NAS	0,9	1,6	1,2	0,1	0,2	C14
Esofago	6,6	14,3	9,9	0,8	1,9	C15
Stomaco	14,4	25,2	21,9	1,7	4,2	C16
Intestino tenue	1,4	1,9	2,1	0,2	0,4	C17
Colon	22,6	39,5	33,9	2,8	6,4	C18
Retto	17,9	23,6	26,3	2,3	4,9	C19-C21
Fegato	15,6	24,9	23,4	2	4,4	C22
Vie biliari	2,8	4,8	4,4	0,2	0,9	C23-C24
Pancreas	9,4	13,4	13,5	1,2	2,4	C25
Cavità nasali	0,6	1,0	0,8	0,1	0,1	C30-C31
Laringe	7,2	13,8	10,3	0,9	1,8	C32
Polmone	37,7	59,5	57,2	4,6	10,9	C33-C34
Altri organi toracici	0,5	0,9	0,7	0	0,1	C37-C39
Mesotelioma	1,1	1,5	1,6	0,2	0,3	C45
Osso	1,4	1,4	1,5	0,1	0,2	C40-C41
Tessuti molli	2,8	3,2	3,5	0,3	0,6	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0,8	0,7	1	0,1	0,2	C46
Pelle, melanomi	7,5	10,2	10	0,8	1,7	C43
Pelle, non melanomi	56,6	87,0	83,1	6,5	15,3	C44
Mammella	0,5	0,8	0,7	0,1	0,1	C50
Prostata	55,5	69,6	83,3	7,7	15,8	C61
Testicolo	7,5	5,1	7,8	0,6	1,2	C62
Pene	0,8	0,7	1,2	0,1	0,2	C60
Altri genitali maschili	0,4	0,4	0,4	0	0,1	C63
Vescica	26,5	39,0	39,5	3,2	7,4	C67
Rene, vie urinarie	11,6	20	16,9	1,4	3,1	C64-C66,C68
Occhio	0,6	1,4	0,7	0	0,1	C69
Encefalo e altro SNC	5,5	9,1	7	0,6	1,2	C70-C72
Tiroide	3,5	3,7	4,2	0,3	0,7	C73
Altre ghiandole endocrine	0,2	0,5	0,3	0	0	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	2,6	2,9	3,1	0,2	0,5	C81
Linfoma non Hodgkin	10,8	16,8	15,2	1,2	2,7	C82-C85,C96
Mieloma	3,3	6,1	5,1	0,4	1,0	C88-C90
Leucemia linfatica	4,7	4,9	5,3	0,4	0,9	C91
Leucemia mieloide	4	4,8	5,5	0,4	1,0	C92
Leucemia monocitica	0,1	0,4	0,1	0	0	C93
Altre leucemie	0,1		0,2	0	0	C94
Leucemie, NAS	0,1	0,8	0,2	0	0,1	C95
Mal definite e metastasi	11,2	25,1	17,4	1,2	3,4	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>314,6</b>	<b>471,7</b>	<b>457,4</b>	<b>37,6</b>	<b>84,7</b>	ALLB
Tutte le sedi	371,2	558,7	540,5	44,2	100	ALLT

**Tabella 6: Provincia di Trento. Tassi standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato e proporzione sul totale specifici per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	Mondo	Europa 99-02	Europa 03-06	Cum 74	%	ICD10
Labbro	0,1	0,4	0,2	0	0,1	C00
Lingua	0,5	0,8	0,7	0,1	0,2	C01-C02
Ghiandole salivari	0,3	0,8	0,4	0	0,1	C07-C08
Bocca	0,6	2,1	1	0,1	0,4	C03-C06
Orofaringe	0,5	0,8	0,7	0,1	0,2	C09-C10
Rinofaringe	0,3	0,1	0,4	0	0,1	C11
Ipopfaringe	0,3	0	0,4	0	0,1	C12-C13
Faringe, NAS	0,1	0,4	0,1	0	0	C14
Esofago	0,7	1,8	1,1	0,1	0,4	C15
Stomaco	7,3	11,7	11,1	0,8	3,6	C16
Intestino tenue	0,6	1,1	1	0,1	0,3	C17
Colon	14	25,2	21	1,7	6,4	C18
Retto	8,8	14,7	12,7	1,1	3,3	C19-C21
Fegato	2,7	6,7	4,3	0,3	1,4	C22
Vie biliari	3,2	4,6	5	0,4	1,7	C23-C24
Pancreas	6,7	8,8	10,1	0,8	3,2	C25
Cavità nasali	0,2	0,2	0,3	0	0,1	C30-C31
Laringe	0,8	1,3	1,1	0,1	0,2	C32
Polmone	10,2	13,5	14,8	1,2	4,2	C33-C34
Altri organi toracici	0,4	0,8	0,4	0	0,1	C37-C39
Mesotelioma	0,3	0,7	0,5	0	0,1	C45
Osso	0,4	1,0	0,3	0	0,1	C40-C41
Tessuti molli	3	2,0	3,4	0,3	0,8	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0,1	0,2	0,3	0	0,1	C46
Pelle, melanomi	7,1	11,6	8,7	0,7	1,8	C43
Pelle, non melanomi	44,1	61,6	62,1	4,7	16,8	C44
Mammella	81,3	108,6	110,8	9,2	25,3	C50
Utero, NAS	0,1	0,3	0,2	0	0,1	C55
Utero, cervice	3,5	5,2	4,6	0,4	1,0	C53
Utero, corpo	12,7	14,5	17,6	1,5	3,9	C54
Ovaio	8,1	13,4	10,7	0,8	2,6	C56
Altri genitali femminili	4,8	3,1	6,7	0,5	1,8	C51-C52,C57
Vescica	6,8	9,9	10	0,8	2,8	C67
Rene, vie urinarie	4,8	7,9	6,6	0,5	1,9	C64-C66,C68
Occhio	0,5	1,2	0,6	0	0,1	C69
Encefalo e altro SNC	5,2	7,2	6,1	0,5	1,2	C70-C72
Tiroide	12,3	12,2	14,6	1,1	2,7	C73
Altre ghiandole endocrine	0,1	0,4	0,1	0	0	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	3,8	3,6	3,9	0,3	0,7	C81
Linfoma non Hodgkin	8,5	13,2	11,8	0,9	3,2	C82-C85,C96
Mieloma	2,7	4,2	4,1	0,3	1,2	C88-C90
Leucemia linfatica	3,4	2,1	3,5	0,2	0,9	C91
Leucemia mieloide	3,1	5,1	4,2	0,3	1,2	C92
Leucemia monocitica	0,3	0,2	0,3	0	0,1	C93
Altre leucemie	0		0	0	0	C94
Leucemie, NAS	0,1	0,3	0,2	0	0,1	C95
Mal definite e metastasi	5,7	13,4	9,2	0,5	3,4	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>237,1</b>	<b>337,4</b>	<b>325,7</b>	<b>26,1</b>	<b>83,2</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	281,1	399,0	387,9	30,8	100	ALLT

**Tabella 7: Tassi di incidenza per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea per sede. Confronti regionali. MASCHI**

<b>SEDE</b>	<b>Trentino 2003-06</b>	<b>Alto Adige 1998-2002</b>	<b>Friuli Venezia Giulia 1999-2003</b>	<b>Veneto 2002-05</b>	<b>POOL 1998-2002</b>	<b>ICD10</b>
Labbro	2,5	1,1	2,5	2,3	1,6	C00
Lingua	3	4,6	4,6	3,7	3,0	C01-C02
Ghiandole salivari	1	1,2	1,0	1,1	1,1	C07-C08
Bocca	5,2	5,9	5,1	5	3,4	C03-C06
Orofaringe	3,6	4,9	3,1		2,5	C09-C10
Rinofaringe	0,9	1,0	1,1	0,7	1,0	C11
Ipopofaringe	3,7	6,9	4,5	2	2,0	C12-C13
Faringe, NAS	1,2	1,9	2,9	1,6	0,9	C14
Esofago	9,9	9,2	10,4	9,4	5,5	C15
Stomaco	21,9	28,5	29,8	19,5	29,0	C16
Intestino tenue	2,1	1,9	1,4	1,7	1,5	C17
Colon	33,9	39,3	50,4	48,7	43,5	C18
Retto	26,3	26,4	20,2		21,1	C19-C21
Fegato	23,4	20,9	25,0	24,3	19,6	C22
Vie biliari	4,4	5,1	4,5	4,5	4,6	C23-C24
Pancreas	13,5	11,8	14,7	16,1	12,5	C25
Cavità nasali	0,8	1,8	0,9	0,8	1,0	C30-C31
Laringe	10,3	11,3	14,7	12,8	13,1	C32
Polmone	57,2	59,0	73,7	80,4	80,9	C33-C34
Altri organi toracici	0,7	0,8	0,4	1,1	1,2	C37-C39
Mesotelioma	1,6	1,3	5,8	1,9	2,6	C45
Osso	1,5	1,1	0,7	1,1	1,2	C40-C41
Tessuti molli	3,5	2,5	3,3	3,4	2,7	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	1	0,5	0,8	0,6	1,4	C46
Pelle, melanomi	10	12,5	14,5	14,2	10,4	C43
Pelle, non melanomi	83,1	27,3	117,0	113,3	87,2	C44
Mammella	0,7	0,4	1,3	1,5	1,1	C50
Prostata	83,3	116,2	113,0	115	77,9	C61
Testicolo	7,8	6,2	5,5	6	5,0	C62
Pene	1,2	0,6	1,1	0,9	1,0	C60
Altri genitali maschili	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	C63
Vescica	39,5	49,7		44,7	51,3	C67
Rene, vie urinarie	16,9	18,9	21,1		19,2	C64-C66,C68
Occhio	0,7	0,3	0,9	1	0,8	C69
Encefalo e altro SNC	7	8,0	8,1	9,6	8,8	C70-C72
Tiroide	4,2	3,2	3,8	4,3	4,5	C73
Altre ghiandole endocrine	0,3	0,4	0,4		0,6	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	3,1	2,6	3,6	3,4	3,5	C81
Linfoma non Hodgkin	15,2	15,7	20,2	18,4	18,0	C82-C85,C96
Mieloma	5,1	5,0	6,4	7,3	6,6	C88-C90
Leucemia linfatica	5,3	7,7	5,4	6,5	6,7	C91
Leucemia mieloide	5,5	5,3	5,3		5,7	C92
Leucemia monocitica	0,1	0,3	0,1		0,1	C93
Altre leucemie	0,2		0		0,1	C94
Leucemie, NAS	0,2	0,2	0,2	0,5	0,8	C95
Mal definite e metastasi	17,4	10,4	14,8	10,8	10,8	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>457,4</b>	<b>512,9</b>	<b>552,3</b>	<b>544,6</b>	<b>490,1</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	540,5	540,2	669,2	657,9	577,3	ALLT

**Tabella 8: Provincia di Trento. Tassi di incidenza per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea per sede. Confronti regionali. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	Trentino 2003-06	Alto Adige 1998-2002	Friuli Venezia Giulia 1999-2003	Veneto 2002-05	POOL 1998-2002	ICD10
Labbro	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	C00
Lingua	0,7	1,3	1,5	1,4	1,0	C01-C02
Ghiandole salivari	0,4	0,8	0,6	0,6	0,7	C07-C08
Bocca	1	1,6	1,8	1,7	1,2	C03-C06
Orofaringe	0,7	0,8	0,5		0,5	C09-C10
Rinofaringe	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	C11
Ipofaringe	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	C12-C13
Faringe, NAS	0,1	0,2	0,6	0,3	0,2	C14
Esofago	1,1	1,6	2,3	1,7	1,2	C15
Stomaco	11,1	17,0	13,7	9,6	14,3	C16
Intestino tenue	1	0,9	1,0	1,0	1,0	C17
Colon	21	28,5	30,7	30,1	28,8	C18
Retto	12,7	12,6	10,6		11,8	C19-C21
Fegato	4,3	3,9	5,9	6,8	6,3	C22
Vie biliari	5	6,6	4,5	4,6	4,9	C23-C24
Pancreas	10,1	10,3	10,8	10,2	8,8	C25
Cavità nasali	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	C30-C31
Laringe	1,1	1,2	1,4	1,1	1,1	C32
Polmone	14,8	16,2	18,1	19,2	16,9	C33-C34
Altri organi toracici	0,4	0,2	0,1	0,4	0,6	C37-C39
Mesotelioma	0,5	0,3	1,0	0,6	0,7	C45
Osso	0,3	0,8	0,7	0,7	1,0	C40-C41
Tessuti molli	3,4	1,6	2,3	2,4	2,1	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	C46
Pelle, melanomi	8,7	13,9	14,2	13,6	10,4	C43
Pelle, non melanomi	62,1	15,3	81,0	71,9	54,2	C44
Mammella	110,8	99,4	123,2	126,6	114,4	C50
Utero, NAS	0,2	0,9	2,3	3,2	1,1	C55
Utero, cervice	4,6	9,1	8,7	5,8	7,8	C53
Utero, corpo	17,6	16,2	14,9	16,6	17,0	C54
Ovaio	10,7	14,3	12,0	11,9	12,7	C56
Altri genitali femminili	6,7	2,6	4,9		3,5	C51-C52,C57
Vescica	10	8,2		8,2	9,2	C67
Rene, vie urinarie	6,6	9,7	9,1		8,2	C64-C66,C68
Occhio	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	C69
Encefalo e altro SNC	6,1	5,8	4,4	6,2	6,5	C70-C72
Tiroide	14,6	6,1	13,5	13,7	13,7	C73
Altre ghiandole endocrine	0,1	0,3	0,7		0,6	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	3,9	1,6	2,7	3,4	3,0	C81
Linfoma non Hodgkin	11,8	12,6	15,1	14,0	13,1	C82-C85,C96
Mieloma	4,1	3,4	4,3	5,8	4,6	C88-C90
Leucemia linfatica	3,5	3,5	3,9	3,2	3,9	C91
Leucemia mieloide	4,2	3,9	3,9		3,9	C92
Leucemia monocitica	0,3		0,1		0	C93
Altre leucemie	0		0		0	C94
Leucemie, NAS	0,2	0	0,1	0,5	0,5	C95
Mal definite e metastasi	9,2	7,6	9,5	6,7	7,4	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>325,7</b>	<b>328,0</b>	<b>366,6</b>	<b>367,8</b>	<b>346,5</b>	ALLB
Tutte le sedi	387,9	343,3	447,6	439,7	400,7	ALLT

**Tabella 9: Valle di Fiemme. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0,3	1,7	10,7	4,5	8,3	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0,3	0,9	5,4	3	4,8	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4	0,5	1,7	10,7	5,3	8	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,4	2,7	2,1	2,9	C09-C10
Ipopfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	5	0,9	2,2	13,4	8,2	11,7	C12-C13
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	4	0,5	1,7	10,7	4,9	7,3	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2	0	9	0,7	3,9	24,1	9,8	16,4	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	2	2	0	0	15	3,6	6,5	40,2	24,8	34,5	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	0	8	1,6	3,5	21,4	11,4	16,9	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	2	1	0	12	2,4	5,2	32,2	17,4	25	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0,2	0,9	5,4	2,6	3,9	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	5	0,8	2,2	13,4	7,2	10,8	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	6	1,3	2,6	16,1	9,4	13	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	6	3	4	0	20	3,7	8,7	53,6	26,7	40,1	C33-C34
Osso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,2	0,9	5,4	2,8	4	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0,7	1,7	10,7	8	9,8	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	4	0,7	1,7	10,7	6,7	10,1	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	5	4	5	4	6	3	6	40	6,1	17,4	107,2	58,1	88	C44
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	2	1	34	6,6	14,8	91,2	46,8	70,1	C61
Testicolo	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	1,3	8,0	5,3	6,2	C62
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,4	2,7	0,8	1,7	C60
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	5	5	1	0	20	3,8	8,7	53,6	27,1	42	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5	0,7	2,2	13,4	6,9	10,3	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,4	2,7	2,2	2,5	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0,5	1,3	8,0	4,7	7	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,5	0,9	5,4	7,7	6,8	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,4	2,7	0,7	1,3	C74-C75
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	6	1,1	2,6	16,1	10,3	14,5	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0,9	5,4	1,7	3,3	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,4	2,7	1,7	2,5	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,4	2,7	1,7	2,5	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0,6	1,3	8,0	4,3	6,6	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>190</b>	<b>33,6</b>	<b>82,6</b>	<b>509,4</b>	<b>276,8</b>	<b>404,9</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	0	0	0	0	1	1	2	8	0	9	17	21	24	33	38	43	19	14	230	39,7	100	616,6	334,9	492,9	ALLT

**Tabella 10: Valle di Fiemme. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0,2	1,0	5,2	1,9	2,8	C07-C08
Ipotifaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,5	2,6	1,9	2,9	C12-C13
Stomaco	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	3	2	2	10	1	4,9	26,0	11	15,5	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	1	4	0	0	14	2,2	6,9	36,4	15,1	21,5	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	0	2	0	0	11	2,2	5,4	28,6	15,4	21,4	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	6	0,8	3,0	15,6	6	9,5	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	0	2,0	10,4	1,8	3,6	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1,0	5,2	1,2	2,4	C25
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	8	1,1	3,9	20,8	7,2	11,3	C33-C34
Tessuti molli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0,7	2,0	10,4	9,8	10,5	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,5	2,6	0,6	1,2	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,4	1,0	5,2	3,6	4,4	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	3	0	3	3	4	7	0	27	3	13,3	70,1	29,2	42,7	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	6	13	6	3	3	2	5	0	50	8,8	24,6	129,9	77,1	102,7	C50
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0,5	2,6	0,4	0,9	C55
Utero, service	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,5	1,5	7,8	6,1	7,1	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5	0,8	2,5	13,0	5,7	9	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	7	0,8	3,4	18,2	10,6	14,1	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0,2	1,5	7,8	2,9	4,3	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	1	0	0	8	1,5	3,9	20,8	10,6	14,5	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,5	2,6	0,3	0,7	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,5	2,6	2,4	2,8	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0,6	1,5	7,8	5,8	7,1	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,5	2,6	1,8	2,1	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	1,0	5,2	5,7	6,2	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	7	1	3,4	18,2	10,1	12,1	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	5	0,4	2,5	13,0	5,5	7,7	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	5	0,6	2,5	13,0	3,6	6,1	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0,5	2,6	0,4	0,9	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	2	0	8	0,8	3,9	20,8	6,9	11,2	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>176</b>	<b>25,6</b>	<b>86,7</b>	<b>457,1</b>	<b>231,8</b>	<b>316,5</b>	<b>ALLB</b>	
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>203</b>	<b>28,5</b>	<b>100</b>	<b>527,2</b>	<b>261,1</b>	<b>359,2</b>	<b>ALLT</b>	

**Tabella 1.1: Primiero. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,6	4,5	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1,4	10,3	6,8	8,8	C09-C10
Ipfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,2	4,8	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,6	4,5	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,4	1,4	10,3	5,1	7,6	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	0	7	2,8	4,9	35,9	21	28,2	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	7	1,3	4,9	35,9	15	25	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	5	0,9	3,5	25,6	9,6	16,5	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1,1	1,4	10,3	4,3	6,5	C22
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	2,1	2,8	20,5	11,8	16	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0,5	1,4	10,3	3,7	6,3	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	4	0	14	4	9,8	71,8	32,1	48,6	C33-C34
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0,9	1,4	10,3	6,4	9,1	C45
Oso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,6	4,5	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	0,7	5,1	4,1	4,8	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1,6	2,8	20,5	15	19	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	2	5	2	5	22	4,4	15,4	112,8	54,8	87,1	C44
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	4	5	3	1	24	7,5	16,8	123,0	59,1	88,4	C61
Testicolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,8	1,4	10,3	11,1	10,8	C62
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	4	3	3	15	2,2	10,5	76,9	34	55,6	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0	7	2,9	4,9	35,9	18	26,8	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,6	4,5	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4	0,7	5,1	3,2	4,8	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,7	5,1	7,4	6,5	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	1,5	2,1	15,4	7,5	11,2	C82-C85,C96
Leucemia linfatica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,7	5,1	8,2	6,4	C91
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	2	1	10	1,8	7,0	51,3	21,3	35,7	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>121</b>	<b>37,3</b>	<b>84,6</b>	<b>620,3</b>	<b>322,4</b>	<b>465,3</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	0	0	1	0	2	0	1	2	3	3	5	13	17	21	21	25	18	11	143	41,6	100	733,1	377,2	552,4	ALLT



**Tabella 12: Primiero. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1,9	9,8	1,1	2,3	C00
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	8	0,4	7,6	39,3	8,3	14,1	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0,4	1,9	9,8	3,2	4,7	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,5	3,8	19,7	4	7,1	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,4	1,9	9,8	4,4	7	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,0	4,9	0,6	1,1	C22
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0,5	2,9	14,7	3,4	5,9	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,0	4,9	0,6	1,1	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	0	7	2,2	6,7	34,4	16,3	23,1	C33-C34
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,5	1,0	4,9	1,9	2,8	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	6	1,7	5,7	29,5	21,4	25,2	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	1	3	5	3	20	3,7	19,0	98,3	40,6	55,6	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	5	2	0	21	5,9	20	103,2	53,3	74,3	C50
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,9	1,9	9,8	6,1	7,9	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5	1,5	4,8	24,6	15,8	20,7	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1,9	9,8	1,3	2,5	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0,9	3,8	19,7	8,3	12,4	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0,4	1,9	9,8	4,4	7	C64-C66,C68
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,0	4,9	0,6	1,1	C74-C75
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1,9	9,8	1,6	3,2	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,0	4,9	0,6	1,1	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,0	4,9	3,4	5,1	C91
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	7	1,2	6,7	34,4	14,1	19,3	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>17,9</b>	<b>81,0</b>	<b>417,8</b>	<b>174,7</b>	<b>249,1</b>	ALLB
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>105</b>	<b>21,6</b>	<b>100</b>	<b>516,1</b>	<b>215,3</b>	<b>304,7</b>	ALLT

**Tabella 13: Bassa Valsugana e Tesino. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0,2	1,3	7,9	2,9	5,4	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,9	2,8	3,7	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	5	0,5	1,6	9,8	4,5	7,1	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,9	2,8	3,7	C09-C10
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0,3	1,0	5,9	3,4	4,8	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	1	9	0,7	2,9	17,7	8,4	12,9	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	7	2	4	4	0	25	3,1	8,0	49,1	24,9	37,2	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	3	4	1	1	17	2	5,4	33,4	17,5	26,6	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	0	11	1,1	3,5	21,6	8,6	13,9	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0,6	3,9	1,2	2,3	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	2	2	1	0	11	1,5	3,5	21,6	13,4	17,3	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0,4	0,6	3,9	2,4	3,2	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,2	0,6	3,9	1,8	2,8	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	9	6	7	6	1	40	5	12,8	78,6	39,5	58,6	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,3	2,0	1,4	1,9	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,2	0,6	3,9	1,4	2,3	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,9	2,8	3,4	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	0,5	1,3	7,9	5,1	7	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	7	7	4	4	4	1	31	4,2	9,9	60,9	31,1	45,9	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,2	0,3	2,0	1,2	1,6	C50
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	4	10	7	1	36	3,5	11,5	70,7	31,5	49,5	C61
Testicolo	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,9	4,3	4,2	C62
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	4	10	6	2	4	38	5,1	12,1	74,6	38,9	58,4	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	5	0	1	2	13	2	4,2	25,5	15,9	21,1	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,2	0,6	3,9	1,4	2,3	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	6	0,7	1,9	11,8	6,5	10	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,3	2,0	1,5	1,8	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,3	2,0	1,5	1,8	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0,4	0,6	3,9	2,2	3,3	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	2	4	1	0	1	1	14	2,1	4,5	27,5	18,8	23,9	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	5	0,6	1,6	9,8	4,8	7,6	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,2	0,3	2,0	0,9	1,4	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0,2	0,6	3,9	1,5	2,6	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	0	4	1	14	1,7	4,5	27,5	13,9	20,8	Oeu
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>282</b>	<b>34,4</b>	<b>90,1</b>	<b>553,8</b>	<b>289,7</b>	<b>424,3</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	0	0	0	1	3	0	0	2	3	13	15	23	37	54	50	41	17	313	38,6	100	614,7	320,8	470,2	ALLT

**Tabella 14: Bassa Valsugana e Tesino. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,3	1,9	1,8	2,1	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0,6	3,7	0,5	0,9	C03-C06
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	1,9	0,2	0,4	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	3	0	10	0,5	3,1	18,6	5,4	8,3	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	2	2	2	14	1,3	4,3	26,1	10,4	15,1	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	3	2	1	12	1	3,7	22,3	8,9	12,9	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0,3	0,9	5,6	1,5	2,4	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4	0,2	1,2	7,4	2	3,3	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	2	3	12	1,2	3,7	22,3	8,3	12,2	C25
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	1	2	5	14	1,2	4,3	26,1	9,9	14,3	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,3	1,9	0,2	0,4	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,3	1,9	1,6	2,2	C45
Tessuti molli	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,7	6,6	5,3	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	7	0,8	2,2	13,0	7,6	9	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	4	4	3	7	8	10	10	56	4,5	17,3	104,3	41,8	61	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	4	5	9	8	7	8	9	10	8	8	10	86	9,5	26,6	160,1	85,2	115,9	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0,4	1,2	7,4	4,5	5,5	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	3	1	1	0	14	1,7	4,3	26,1	13	18,5	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	3	0	9	0,8	2,8	16,8	7,6	10,9	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	6	0,2	1,9	11,2	2,4	4,1	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	2	1	3	13	1,1	4,0	24,2	9	13,6	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,3	1,9	1,6	2,2	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,3	1,9	1,3	1,9	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0,9	1,5	9,3	10,4	9,9	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	1,2	2,8	16,8	13,6	15,9	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,3	0,6	3,7	3,9	3,9	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	5	2	13	0,6	4,0	24,2	8,1	11,8	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	7	0,3	2,2	13,0	3,5	5,6	C88-C90
Leucemia linfatica	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0,4	0,9	5,6	9,9	7	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,2	0,6	3,7	0,8	1,4	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	8	0,2	2,5	14,9	2,9	5,2	Oeu
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>267</b>	<b>25,2</b>	<b>82,7</b>	<b>497,2</b>	<b>242,5</b>	<b>322,1</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>323</b>	<b>29,7</b>	<b>100</b>	<b>601,4</b>	<b>284,3</b>	<b>383,1</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 15: Alta Valsugana. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,0	0,3	0,5	C00	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0,3	0,6	4,2	2,3	3,4	C01-C02	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	0,4	0,6	4,2	2,3	3,9	C03-C06	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3	0,3	0,5	3,1	2,2	2,9	C09-C10	
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	5	0,5	0,8	5,2	3,6	4,9	C12-C13	
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,2	0,3	2,1	1,5	2	C14	
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	1	2	3	13	0,7	2,0	13,6	7,5	11,5	C15	
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	3	5	6	0	26	1,5	4,0	27,3	13,8	21,2	C16	
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,3	0,3	2,1	1,1	1,7	C17	
Colon	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	4	8	6	5	5	6	46	3,1	7,2	48,2	26,7	40,5	C18	
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	8	7	7	1	2	33	2,6	5,1	34,6	19,1	28,7	C19-C21	
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	9	8	1	1	28	2,1	4,4	29,4	15,5	23,8	C22	
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	0	10	0,6	1,6	10,5	4,8	7,5	C23-C24	
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	2	2	1	14	1	2,2	14,7	7,8	12	C25	
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	1	1	0	0	13	1,2	2,0	13,6	8,9	12,3	C32	
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	9	13	15	3	4	62	4,4	9,6	65,0	35,2	53,7	C33-C34	
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,1	0,3	2,1	1,1	1,6	C45	
Osso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	0,8	1,1	C40-C41	
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,2	0,3	2,1	1,4	1,7	C47,C49	
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	0,7	0,8	C46	
Pelle, melanomi	0	0	1	0	0	0	0	2	1	11	8	10	7	10	14	8	5	10	0,7	1,6	10,5	8,6	9,8	C43	
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	8	10	7	10	14	8	5	92	6,3	14,3	96,5	56,2	81,1	C44	
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0,2	0,3	2,1	1,2	1,9	C50	
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	18	21	33	25	9	2	119	9,7	18,5	124,8	67,1	100,9	C61	
Testicolo	0	0	0	0	2	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0,7	1,6	10,5	8,6	9,5	C62	
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0,2	0,5	3,1	1,9	2,8	C60	
Altri genitali maschili	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	1,9	1,3	C63	
Vescica	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	8	10	5	8	5	3	4	47	3,6	7,3	49,3	29,2	42,3	C67	
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	1	3	0	1	1	16	1,4	2,5	16,8	10,6	14,9	C64-C66,C68	
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,2	1,0	0,4	0,7	C69	
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	1	0	7	0,5	1,1	7,3	4	6	C70-C72	
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0,2	0,5	3,1	1,9	2,6	C73	
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0,1	0,5	3,1	1,8	2,6	C81	
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	1	1	3	3	18	1	2,8	18,9	10,6	15,9	C82-C85,C96	
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	0	0	9	0,9	1,4	9,4	5,7	8,1	C88-C90	
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0,1	0,6	4,2	2,2	3,4	C91	
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0	1	10	0,9	1,6	10,5	5,6	8,7	C92	
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	4	2	16	0,8	2,5	16,8	7,9	12,8	Oeu	
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>106</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>551</b>	<b>40,8</b>	<b>85,7</b>	<b>577,8</b>	<b>326</b>	<b>479,9</b>	<b>ALLB</b>	
Tutte le sedi	0	1	1	0	1	4	5	10	6	23	33	67	87	90	120	103	55	37	643	47,1	100	674,2	382,2	561	ALLT

**Tabella 16: Alta Valsugana. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-	5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0	0,2	1,0	0,2	0,4	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0	0,2	1,0	0,2	0,4	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0	0,2	1,0	0,1	0,3	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0	0,2	1,0	0,1	0,3	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	C11
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	0,2	0,7	4,1	1,2	1,9	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	3	3	6	18	0,6	3,2	18,3	5,7	9,0	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	0,4	0,7	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	35	1,8	6,2	35,6	13,6	20,5	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	3	4	1	5	1	21	1,3	3,7	21,4	10,2	14,5	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	1	11	0,6	1,9	11,2	4,0	6,3	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	8	0,1	1,4	8,1	1,9	3,2	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	5	4	1	15	0,5	2,6	15,3	5,3	8,3	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,0	0,7	1,1	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0,2	0,5	3,1	1,8	2,6	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	3	5	6	4	23	0,7	4,0	23,4	7,9	12,3	C33-C34
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0	0,2	1,0	0,2	0,4	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	7	0,5	1,2	7,1	4,2	5,3	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4	0	0	1	1	1	0	1	12	0,9	2,1	12,2	9,2	11,3	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	5	8	5	10	4	16	19	12	95	4,2	16,7	96,7	43,4	62,0	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	4	7	10	18	13	12	11	18	12	15	12	8	140	9,1	24,6	142,5	82,9	111,8	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	7	0,3	1,2	7,1	3,4	5,0	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	2	3	2	2	1	20	1,4	3,5	20,4	11,4	15,9	C54
Ovaio	0	0	1	0	0	0	2	1	0	4	1	1	0	0	2	2	3	3	20	1,0	3,5	20,4	12,6	15,1	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	0	1	8	0,5	1,4	8,1	3,8	5,4	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	3	5	0	3	20	1,2	3,5	20,4	9,7	14,6	C67
Rene, vie urinarie	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	1	1	11	0,6	1,9	11,2	6,2	7,9	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	8	0,7	1,4	8,1	7,2	7,9	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10	0,7	1,8	10,2	7,8	9,4	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0,2	0,5	3,1	1,4	2,1	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	1	3	4	1	1	3	4	23	1,3	4,0	23,4	12,6	16,5	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	6	0,3	1,1	6,1	2,3	3,5	C88-C90
Leucemia linfatica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0,1	0,4	2,0	2,4	1,8	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	7	0,1	1,2	7,1	1,6	2,7	C92
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0	0,2	1,0	0,1	0,3	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	2	4	9	23	0,8	4,0	23,4	9,1	12,9	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>474</b>	<b>26,0</b>	<b>83,3</b>	<b>482,6</b>	<b>242,4</b>	<b>332,3</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	1	1	2	2	2	4	12	16	23	38	38	35	42	53	64	78	83	75	569	30,2	100,0	579,3	285,8	394,4	ALLT

**Tabella 17: Valle dell'Adige. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE CR74	%	GREZZO MONDO	EUROPA	ICD10											
Labbro	0	0	0	0	0	0	5	1	3	13	0,2	4,0	3,1	C00											
Lingua	0	0	0	0	1	0	0	2	0	7	0,2	2,2	1,7	C01-C02											
Ghiandole salivari	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	1,2	1,1	C07-C08											
Bocca	0	0	0	0	1	2	3	4	1	27	0,6	8,4	6,6	C03-C06											
Orofaringe	0	0	0	0	4	2	3	1	0	11	0,2	3,4	3	C09-C10											
Rinofaringe	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0,1	1,2	0,8	C11											
Ipopfaringe	0	0	0	0	2	2	3	2	0	13	0,3	4,0	3,5	C12-C13											
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0,1	1,6	1	C14											
Esofago	0	0	0	0	0	8	4	5	2	49	0,9	15,2	11,5	C15											
Stomaco	0	0	0	0	5	7	12	16	10	78	1,3	24,2	19,5	C16											
Intestino tenue	0	0	0	0	4	5	12	16	6	6	0,1	1,9	1,6	C17											
Colon	0	0	0	0	4	7	10	25	29	152	2,8	47,3	35,5	C18											
Retto	0	0	1	0	2	12	18	19	13	115	2,3	35,7	27,7	C19-C21											
Fegato	0	0	0	0	2	6	7	16	8	86	1,8	26,7	21,1	C22											
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	1	2	2	18	0,3	5,6	3,9	C23-C24											
Pancreas	0	0	0	0	0	4	7	13	7	59	1,3	18,3	14,1	C25											
Cavità nasali	0	0	0	0	0	4	4	4	2	36	0,9	11,2	9,7	C30-C31											
Laringe	0	0	0	0	2	8	4	8	3	36	0,9	11,2	9,7	C32											
Polmone	0	0	0	2	6	13	26	48	14	251	4,9	78,0	60,8	C33-C34											
Altri organi toracici	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	0,1	1,6	1	C37-C39											
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0,1	1,2	1	C45											
Osso	0	3	0	1	0	0	1	0	0	7	0,2	2,2	2,2	C40-C41											
Tessuti molli	0	0	0	1	2	0	3	1	1	16	0,3	5,0	3,9	C47,C49											
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,1	1,6	1,3	C46											
Pelle, melanomi	0	0	0	1	1	3	3	8	3	44	0,9	13,7	11	C43											
Pelle, non melanomi	0	0	2	1	5	18	30	56	55	412	7,7	128,1	101,4	C44											
Mammella	0	0	0	0	7	18	30	56	35	3	0,1	0,9	0,6	C50											
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	382	8,5	118,8	91,8	C61											
Testicolo	0	0	2	6	6	2	7	79	35	30	0,6	9,3	8,6	C62											
Pene	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0,3	0,2	C60											
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0,6	0,4	C63											
Vescica	0	0	0	1	3	5	6	29	7	159	2,8	49,4	37,2	C67											
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	2	4	6	11	4	66	1,2	20,5	16	C64-C66,C68											
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	0,3	C69											
Encefalo e altro SNC	0	0	1	0	1	3	3	3	1	25	0,5	7,8	6,5	C70-C72											
Tiroide	0	0	1	2	3	1	1	2	0	17	0,3	5,3	4,7	C73											
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,3	0,3	C74-C75											
Linfoma di Hodgkin	0	0	1	3	2	1	0	1	0	14	0,3	4,4	4	C81											
Linfoma non Hodgkin	0	0	2	1	4	5	4	12	3	60	1,1	18,7	14,7	C82-C85,C96											
Mieloma	0	0	0	1	1	3	5	4	0	18	0,3	5,6	4,4	C88-C90											
Leucemia linfatica	2	1	1	0	0	3	3	4	3	28	0,6	8,7	7,9	C91											
Leucemia mieloide	0	1	0	0	1	2	3	3	3	24	0,3	7,5	5,8	C92											
Leucemia monocitica	0	0	0	0	1	0	4	2	1	2	0	0,6	0,4	C93											
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,6	0,4	C95											
Mal definite e metastasi	0	0	1	0	4	5	9	16	9	81	1,5	25,2	19,3	OeU											
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>168</b>	<b>241</b>	<b>306</b>	<b>344</b>	<b>389</b>	<b>466</b>	<b>522</b>	<b>600</b>	<b>729,0</b>	<b>82,4</b>	<b>600,9</b>	<b>470,9</b>	<b>ALLB</b>	
<b>Tutte le sedi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>207</b>	<b>292</b>	<b>360</b>	<b>446</b>	<b>535</b>	<b>624</b>	<b>723</b>	<b>845</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>729,0</b>	<b>393,3</b>	<b>572,3</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 18: Valle dell'Adige. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,1	0,3	0	0,1	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0,6	0,2	0,3	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0,1	1,2	0,8	0,8	C03-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	6	0	1,8	0,4	0,7	C07-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0,9	0,5	0,7	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	0,1	0,1	C11
Ipfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	0,2	0,3	C12-C13
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,1	1,2	0,5	0,7	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	14	11	14	9	63	0,8	18,4	6,5	10	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	6	0,1	1,8	0,6	0,9	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	16	14	23	27	26	24	151	7,6	44,2	16,8	25,3	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	10	8	6	7	8	57	1,0	16,7	7,5	10,9	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	7	3	22	0,2	6,4	2,1	3,2	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	7	7	11	9	46	0,5	13,5	4,3	6,8	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	14	8	8	11	58	0,9	17,0	6,4	9,6	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,6	0,3	0,4	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0,1	1,2	0,6	0,9	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11	9	15	9	15	11	89	1,4	26,1	11,5	16,5	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,1	0,6	0,3	0,4	C37-C39
Osso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0,6	0,4	0,5	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,2	2,6	2,0	2,3	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,6	0,1	0,2	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,6	0,1	0,2	C46
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,6	0,1	0,2	C46
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,6	10	7,0	8,2	C43
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	5,8	108,9	51,8	72,2	C44
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	9,0	144,0	80,5	110,2	C50
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	0,2	0,3	C55
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,3	5,3	2,9	3,9	C53
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1,4	20,5	11,9	16,0	C54
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0,8	14,1	7,8	10,4	C56
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,4	6,7	3,5	4,7	C51-C52,C57
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0,7	17,0	6,6	9,8	C67
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0,6	11,1	4,9	7,0	C64-C66,C68
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,9	0,5	0,8	C69
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0,5	7,6	4,8	6,0	C70-C72
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1,5	21,4	16,9	19,8	C73
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,3	0,2	0,2	C74-C75
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,3	4,7	4,2	4,3	C81
Leucemia linfatica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0,8	14,3	6,9	9,6	C82-C85,C96
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,3	7,0	2,4	3,8	C88-C90
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1	5,9	2,2	2,9	C91
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,3	5,3	2,7	3,5	C92
Tutte le sedi meno cute	1	1	4	4	8	9	24	42	70	104	119	131	144	178	190	208	212	1607	25,8	470,4	232,5	320,4	OeU
Tutte le sedi	1	1	4	4	9	10	35	56	81	128	141	153	190	214	233	262	259	1979	31,6	579,3	284,3	392,7	ALLB
																			100				ALLT

**Tabella 19: Valle di Non. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10									
Labbro	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0,3	0,6	4,0	2	2,8	C00									
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	0,6	4,0	2,8	3,5	C01-C02									
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,2	0,4	2,7	1,7	2,4	C07-C08									
Bocca	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0,4	1,4	9,3	4,8	6,7	C03-C06									
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,2	0,4	2,7	1,8	2,5	C09-C10									
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,2	1,3	0,7	1	C11									
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	0,6	4,0	2,3	3,3	C12-C13									
Esofago	0	0	0	0	0	0	3	3	1	13	1,3	2,7	17,3	8,9	12,9	C15									
Stomaco	0	0	0	0	0	2	1	3	4	25	2,2	5,1	33,3	16,3	24,6	C16									
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0,1	0,6	4,0	1,5	2,6	C17									
Colon	0	0	0	0	0	2	4	5	7	30	2,7	6,2	40	20,1	30,2	C18									
Retto	0	0	0	0	1	1	2	4	4	22	1,9	4,5	29,3	14,3	21,3	C19-C21									
Fegato	0	0	0	0	1	1	5	2	3	19	1,8	3,9	25,3	14,2	20,6	C22									
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0,2	0,8	5,3	1,7	3	C23-C24									
Pancreas	0	0	0	0	0	1	3	2	1	17	1,7	3,5	22,7	13,2	18,9	C25									
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0,3	0,6	4,0	2,1	3,1	C30-C31									
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0,5	1,2	8,0	3,4	5,5	C32									
Polmone	0	0	0	0	0	2	7	11	10	56	4,3	11,5	74,7	34,7	54	C33-C34									
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,3	0,4	0,8	C37-C39									
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,1	0,2	1,3	0,9	1,2	C45									
Osso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	0,8	1,1	C40-C41									
Tessuti molli	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0,6	1,0	6,7	5,7	6,5	C47,C49									
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,5	0,8	5,3	4	4,6	C43									
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	1	4	8	14	6	73	6,5	15,0	97,3	50,1	73,8	C44									
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0,2	0,4	2,7	1,1	1,8	C50									
Prostata	0	0	0	0	0	0	4	15	12	73	5,6	15,0	97,3	44,7	68,7	C61									
Testicolo	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0,5	1,0	6,7	6,3	6,5	C62									
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	1	1,3	C60									
Vescica	0	0	0	0	0	1	8	7	4	36	3,3	7,4	48,0	27,4	38,7	C67									
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1	3	2	4	15	1	3,1	20	9,5	14,2	C64-C66,C68									
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0,8	1,4	9,3	5,4	7,5	C70-C72									
Tiroide	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	0,7	1,4	9,3	7,6	8,6	C73									
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0,4	2,7	1,4	2	C81									
Linfoma non Hodgkin	0	1	0	0	1	1	2	3	1	18	1,6	3,7	24,0	16,3	20,3	C82-C85,C96									
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0,2	0,4	2,7	1	1,6	C88-C90									
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	0,6	4,0	2,2	3,1	C92									
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,3	0,3	0,6	C95									
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	0,9	2,1	13,3	6,2	9,7	Oeu									
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>413</b>	<b>35,2</b>	<b>85,0</b>	<b>550,5</b>	<b>288,5</b>	<b>417,6</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	0	1	0	3	1	3	2	5	10	10	24	37	69	63	92	77	57	32	486	41,7	100	647,9	338,6	491,4	ALLT



**Tabella 20: Valle di Non. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	0,8	1	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,3	0,3	0,5	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	0,5	0,8	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	1,1	1,3	C11
Ipfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2	0,5	2,6	1,9	2,5	C12-C13
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,3	0,5	2,6	1,6	2,1	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	2	2	1	3	24	0,7	5,5	31,5	8,8	14,4	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0,1	0,7	3,9	1,6	2,6	C17
Colon	0	0	0	0	0	1	0	3	2	21	0,9	4,8	27,5	8,6	13,8	C18
Retto	0	0	0	0	0	1	2	4	0	13	1,3	3,0	17,1	9,9	13,8	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0,4	0,9	5,2	2,6	3,6	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0,3	1,8	10,5	2,5	4,3	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	1	2	3	1	14	1,1	3,2	18,4	9	12,6	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,2	0,5	2,6	2,1	2,6	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	4	2	14	0,9	3,2	18,4	6,1	9,8	C33-C34
Altri organi toracici	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	3,3	2,2	C37-C39
Tessuti molli	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	0,7	3,9	3,6	3,3	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	0,7	3,9	2,3	2,9	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	6	5	8	15	85	6	19,4	111,5	48,2	68,7	C44
Mammella	0	0	0	0	0	6	10	11	14	110	9,3	25,1	144,3	82,5	110,4	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,3	0,7	3,9	2,7	3,3	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	2	6	1	3	17	1,1	3,9	22,3	10,1	15,6	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0,4	1,4	7,9	3,3	4,6	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,1	2,1	11,8	2,1	4	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	1	2	3	2	10	0,9	2,3	13,1	7,9	10,7	C67
Rene, vie urinarie	1	0	0	0	0	1	0	1	3	12	0,8	2,7	15,7	8,9	10,6	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	1	0	0	0	0	1	2	1	0	8	0,8	1,8	10,5	9,3	10,2	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	2	1	1	0	12	1,1	2,7	15,7	12,9	15,5	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0,4	0,9	5,2	4,6	5,3	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	1	2	0	2	13	0,5	3,0	17,1	6	9,2	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	0,3	1,4	7,9	2,6	4	C88-C90
Leucemia linfatica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0,5	2,6	3,4	2,5	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0,1	0,7	3,9	1,1	1,9	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,3	0,8	1	C93
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	1	1	2	19	0,4	4,3	24,9	5,4	9,3	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>24,1</b>	<b>80,6</b>	<b>463,1</b>	<b>230,1</b>	<b>311,9</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>30,1</b>	<b>100</b>	<b>574,6</b>	<b>278,2</b>	<b>380,6</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 21: Valle di Sole. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE CR74	%	GREZZO MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,3	3,3	2,9	C00
Lingua	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0,5	10	8,1	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,3	3,3	2,9	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,2	3,3	3,3	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0,7	10	9,7	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,3	2	C11
Ipfaringe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,5	6,7	6,4	C12-C13
Esofago	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	1,1	20	15,9	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2,3	33,3	24,6	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,7	6,7	5,6	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	2	1	0	8	2,3	26,7	21,7	C18
Retto	0	0	0	0	1	5	1	2	0	14	3,5	46,7	38,7	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	2	1	0	8	1,5	26,7	19,6	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0,3	10	7,8	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	3	2	0	9	2,2	30	23,7	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,3	3,3	3,2	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0,9	13,3	10,6	C32
Polmone	0	0	0	0	0	2	2	5	3	19	3,8	63,4	45,7	C33-C34
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,5	10	7,2	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	3,3	2,5	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,5	10	7,1	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	1	1	5	1	13	3,7	43,4	33,3	C44
Prostata	0	0	0	0	0	2	6	11	9	50	10,2	166,7	121,8	C61
Testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	6,7	5,3	C62
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	3,3	2,5	C63
Vescica	0	0	0	0	0	2	4	3	2	17	3,5	56,7	42,1	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1,5	20	16,3	C64-C66,C68
Occhio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,3	6,7	6,8	C69
Encefalo e altro SNC	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0,8	10	11,2	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,4	6,7	6,2	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,6	6,7	5,5	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0,5	16,7	11,9	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	10	7,3	C88-C90
Leucemia linfatica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	3,3	4,6	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	3,3	2,5	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	10	7,1	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>201</b>	<b>42,7</b>	<b>670,3</b>	<b>520,2</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	2	1	0	0	1	1	1	3	9	214	46,4	713,7	553,5	ALLT

**Tabella 22: Valle di Sole. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0,3	1,7	9,7	2,3	4	C03-C06
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,3	0,6	3,2	1,9	2,5	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	6	1,2	3,4	19,4	8,1	11,3	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	2	9	0,9	5,2	29,1	9,7	14,8	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5	0,9	2,9	16,2	8,2	11,2	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,3	1,1	6,5	2,6	3,8	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,6	1,1	6,5	3,2	4,5	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	2	9	1,9	5,2	29,1	11,5	16,9	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,3	0,6	3,2	1,3	1,9	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5	0,9	2,9	16,2	8,4	12,2	C33-C34
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0,6	3,2	2,6	3	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	1,7	9,7	1,8	3,6	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,3	1,1	6,5	2,6	3,8	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	4	3	5	18	1,6	10,3	58,3	21,5	31,4	C44
Mammella	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	5	8	7	10	3	3	3	56	13,3	32,2	181,3	108	143,7	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,3	0,6	3,2	1,9	2,5	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	2	1	1	0	10	2,3	5,7	32,4	18,2	26,1	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0,6	1,7	9,7	5,7	8	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,6	1,1	6,5	4,3	5,5	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6	1	3,4	19,4	6,6	10	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0,2	2,3	13,0	4	5,9	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,6	3,2	0,7	1,3	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	1,3	2,9	16,2	12,9	16,4	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,3	1,1	6,5	4,7	4,9	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,2	1,1	6,5	3,2	4,3	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0,3	1,1	6,5	1,8	2,9	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1,1	6,5	1	2,1	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,2	1,1	6,5	3,1	4,2	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	9	0,3	5,2	29,1	5,8	10,4	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>156</b>	<b>29</b>	<b>89,7</b>	<b>505,1</b>	<b>245,9</b>	<b>341,9</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>174</b>	<b>30,6</b>	<b>100</b>	<b>563,3</b>	<b>267,5</b>	<b>373,3</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 23: Giudicarie. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10-15	20-25	25-30	30-35	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4	0,6	0,8	5,6	3,7	4,8	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0,1	0,4	2,8	1,2	1,9	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	7	0,5	1,4	9,8	5,6	7,9	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0,2	0,6	4,2	1,7	3,1	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,4	1,1	1,2	C11
Ipopfaringe	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5	0,6	1,0	7,0	4,6	6,2	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,2	0,4	2,8	2	2,6	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	1	8	0,7	1,6	11,2	6,5	9,6	C15
Stomaco	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	2	4	3	25	1,3	4,9	35,1	14,8	24,2	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0,2	0,6	4,2	2,3	3,4	C17
Colon	0	0	0	0	1	1	1	2	5	6	5	1	3	27	3	5,3	37,9	21,9	30,5	C18
Retto	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	5	3	1	25	2,8	4,9	35,1	20,4	28,7	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	4	6	3	30	2,4	5,9	42,2	21,2	32,2	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	0,2	0,8	5,6	3,2	4,5	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	1	9	1	1,8	12,6	6,8	10,1	C25
Laringe	0	0	0	0	0	2	3	1	3	1	2	0	1	13	1,5	2,5	18,3	11,7	15,8	C32
Polmone	0	0	0	1	0	1	0	6	9	9	5	14	2	61	4,2	11,9	85,7	40,4	61,5	C33-C34
Osso	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,4	1,1	1,2	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0,1	0,4	2,8	1,4	1,9	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,2	0,4	2,8	1,2	2	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	1	1	0	10	1,1	2,0	14,1	8,7	11,8	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	1	3	1	2	4	3	8	12	6	14	63	4,8	12,3	88,5	42,6	65	C44
Prostata	0	0	0	0	0	1	2	5	13	14	22	15	4	77	8,6	15,1	108,2	57,3	84,2	C61
Testicolo	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,3	0,6	4,2	4,8	4,5	C62
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0,1	0,4	2,8	1,4	2,3	C60
Vescica	0	0	0	0	0	2	4	1	7	2	5	9	1	33	2,2	6,5	46,4	23	34,2	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	2	17	1,3	3,3	23,9	11,3	17,5	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	7	0,6	1,4	9,8	5,4	7,8	C70-C72
Tiroide	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	6	0,5	1,2	8,4	6,2	7,3	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0,2	0,6	4,2	2,3	3,1	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	3	10	0,7	2,0	14,1	7,4	10,2	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0,2	0,6	4,2	2,4	3,7	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	6	0,6	1,2	8,4	4,1	6,2	C91
Leucemia mieloide	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	9	0,9	1,8	12,6	10,1	11,8	C92
Altre leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	0,2	1,4	0,9	1,2	C94
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	4	5	4	27	2,4	5,3	37,9	19,8	30,1	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>448</b>	<b>39,9</b>	<b>87,7</b>	<b>629,6</b>	<b>337,7</b>	<b>489,4</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>511</b>	<b>44,8</b>	<b>100</b>	<b>718,2</b>	<b>380,3</b>	<b>554,4</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 24: Giudicarie. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,2	2,7	1,6	2,3	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,4	0,3	0,6	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0,3	4,1	3,2	4,1	C09-C10
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	1,4	1,1	1,5	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	2,7	1,0	1,4	C15
Stomaco	0	0	0	0	2	1	1	5	7	27	1,5	36,7	13,6	20,7	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4,1	0,6	1,3	C17
Colon	0	0	0	0	1	0	3	5	4	22	1,2	29,9	10,9	16,2	C18
Retto	0	0	0	0	1	0	2	1	2	14	1,0	19,1	8,3	11,6	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0,5	10,9	3,8	5,9	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	0,4	8,2	3,5	5,1	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	1	1	3	4	16	0,7	21,8	7,6	11,5	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,4	0,2	0,4	C30-C31
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0,9	12,2	7,2	9,1	C33-C34
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1,4	0,5	0,8	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,3	5,4	3,7	4,1	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0,6	6,8	6,0	6,6	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	1	4	3	4	4	12	53	3,5	72,1	33,1	45,5	C44
Mammella	0	0	0	1	7	13	13	16	10	121	10	164,7	92,0	126,1	C50
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,4	0,2	0,4	C55
Utero, cervice	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	0,5	6,8	4,0	5,3	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	1	3	1	2	14	1,3	19,1	10,5	14,9	C54
Ovaio	0	0	0	0	1	2	1	2	3	14	1,1	19,1	9,0	12,6	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	1	3	1	1	10	0,8	13,6	6,9	9,5	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	1	4	1	9	0,4	12,2	4,2	6,6	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7	0,2	9,5	3,0	4,9	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,1	1,4	1,0	1,2	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	1	1	2	3	1	10	1,1	13,6	8,3	10,9	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0,6	6,8	6,6	6,9	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,4	5,4	3,9	4,2	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0,7	12,2	7,8	9,8	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0,1	5,4	1,1	1,9	C88-C90
Leucemia linfatica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	6,8	5,1	4,5	C91
Leucemia mieloblastica	1	0	0	0	1	0	0	1	2	11	0,9	15,0	10,2	11,4	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1,4	1,7	1,5	C93
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	1	4	5	18	1,2	24,5	8,4	12,4	OeU
Tutte le sedi meno cute	1	1	0	2	14	24	32	41	53	374	27,8	509,0	256,9	348,4	ALLB
Tutte le sedi	1	1	0	2	3	26	35	42	57	427	31,3	581,1	290,1	393,9	ALLT

**Tabella 25: Alto Garda e Ledro. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0- 5-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,9	1,2	C00	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0,5	0,7	4,7	2,7	3,7	C01-C02	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,7	0,9	C03-C06	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	1	7	0,4	1,2	8,1	4,2	6,1	C09-C10	
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,2	0,7	4,7	2,3	3,6	C12-C13	
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	1	1,1	C14	
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	0	8	0,6	1,4	9,3	5,5	7,8	C15	
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3	4	4	2	1	23	1,7	3,9	26,8	14,5	20,8	C16	
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4	0,2	0,7	4,7	2	3,1	C17	
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	8	4	6	5	36	2,4	6,2	41,9	20,3	31,4	C18	
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	7	3	3	0	32	2,9	5,5	37,2	20,4	29,4	C19-C21	
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	4	1	29	2,1	5,0	33,8	16,3	24,7	C22	
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	6	0,2	1,0	7,0	2,7	4,6	C23-C24	
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	1	0	1	1	0	12	1	2,1	14,0	8,4	11,9	C25	
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,8	1	C30-C31	
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	2	1	1	2	0	0	16	1,3	2,7	18,6	12,1	17,1	C32	
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	6	8	8	12	10	4	53	3,1	9,1	61,7	28,6	44,1	C33-C34	
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,8	1	C37-C39	
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0,4	0,5	3,5	2,1	2,8	C45	
Ossso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	1	1,1	C40-C41	
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0,2	0,5	3,5	1,8	2,5	C47,C49	
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	1	1,1	C46	
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	1	0	0	10	0,9	1,7	11,6	8,4	11	C43	
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	18	6	11	14	1	90	6,6	15,4	104,7	60	82,4	C44	
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,8	1	C50	
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	24	26	15	7	4	106	9,3	18,2	123,4	65,3	95,8	C61	
Testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,7	1,4	9,3	8,9	9,4	C62	
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,1	0,3	2,3	1,1	1,7	C60	
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,2	0,6	0,8	C63	
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	2,8	7,2	48,9	23,1	36,1	C67	
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	1	3	3	2	22	1,5	3,8	25,6	13,1	19,7	C64-C66,C68	
Encefalo e altro SNC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	0,5	0,7	4,7	4,3	4,4	C70-C72	
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,5	0,9	5,8	5,2	5,6	C81	
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	14	1,5	2,4	16,3	10,4	14,3	C82-C85,C96	
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	0	0	0	5	0,1	0,9	5,8	2,1	3,7	C88-C90	
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	0,5	3,5	1,9	2,9	C91	
Leucemia mieloida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,3	0,9	5,8	2,1	3,6	C92	
Altre leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,2	0,4	0,7	C94	
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,2	0,3	0,5	C95	
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	6	4	2	17	0,5	2,9	19,8	8,5	13,9	OeU	
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>87</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>37,2</b>	<b>84,6</b>	<b>574,9</b>	<b>306,4</b>	<b>446,6</b>	<b>ALLB</b>	
Tutte le sedi	0	1	0	1	3	4	6	4	6	20	43	43	74	105	89	89	69	27	584	43,8	100	679,7	366,4	529	ALLT

**Tabella 26: Alto Garda e Ledro. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,2	1,1	0,1	0,3	C00
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	0,3	0,8	4,4	2,1	2,9	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,6	0,8	C09-C10
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	0,1	0,8	4,4	1,4	2,1	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4	1	0	1	9	0,7	1,7	9,9	5,0	7,2	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,5	0,7	C17
Colon	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	2	6	7	2	2	6	34	2,4	6,5	37,4	17,8	25,8	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	5	4	1	0	21	1,6	4,0	23,1	11,7	16,9	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	6	0,3	1,2	6,6	2,5	3,7	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0,3	0,8	4,4	2,8	3,9	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	6	4	18	0,6	3,5	19,8	6,6	9,9	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0,2	0,4	2,2	1,7	2,2	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	2	4	3	6	1	25	1,5	4,8	27,5	11,9	17,2	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,8	1,0	C37-C39
Mesotelio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,1	0,4	2,2	0,9	1,3	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	8	0,3	1,5	8,8	3,2	4,7	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,4	2,2	0,5	0,9	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	2	1	0	8	0,4	1,5	8,8	4,6	6,1	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	6	8	8	6	7	5	6	5	7	7	17	10	85	4,5	16,3	93,4	45,6	63,7	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	2	6	13	9	14	19	14	15	13	12	11	128	8,7	24,6	140,6	74,5	103,0	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	9	0,8	1,7	9,9	7,0	9,4	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	8	2	3	2	1	27	2,0	5,2	29,7	16,3	22,2	C54
Ovaio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	8	0,6	1,5	8,8	5,4	6,8	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	0	2	1	11	0,8	2,1	12,1	6,4	8,7	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	2	2	12	0,6	2,3	13,2	5,3	7,9	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	1	2	1	13	0,9	2,5	14,3	6,6	9,3	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4	0,3	0,8	4,4	2,7	3,7	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	2	1	0	0	0	1	0	12	0,9	2,3	13,2	9,3	11,9	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0,4	2,2	1,7	2,0	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	3	4	2	3	1	18	1,2	3,5	19,8	8,9	12,6	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	0	8	0,7	1,5	8,8	4,9	6,5	C88-C90
Leucemia linfatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,6	0,8	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	0	8	0,5	1,5	8,8	4,9	7,1	C92
Leucemia monocitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,8	1,0	C93
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1	0,2	1,1	0,6	0,8	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	5	5	3	3	21	1,0	4,0	23,1	8,1	12,9	Oeu
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>435</b>	<b>28,5</b>	<b>83,7</b>	<b>477,9</b>	<b>238,4</b>	<b>334,5</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>57</b>	<b>520</b>	<b>32,9</b>	<b>100</b>	<b>571,3</b>	<b>284,0</b>	<b>398,2</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 27: Vallagarina. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4	0,1	0,4	2,4	1	1,6	C00	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	6	0,2	0,5	3,6	1,7	2,5	C01-C02	
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0,2	1,2	0,6	0,9	C07-C08	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5	0,2	0,4	3,0	1,7	2,5	C03-C06	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0,2	0,4	3,0	2,1	2,8	C09-C10	
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	0,4	2,4	1	1,6	C11	
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0,2	0,4	2,4	1,6	2,1	C12-C13	
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0,1	0,3	1,8	1,1	1,5	C14	
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	1	3	2	0	17	0,6	1,5	10,3	5,6	8	C15	
Stomaco	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	6	7	19	13	6	4	60	2,3	5,3	36,4	17,2	26,4	C16	
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	0	7	0,3	0,6	4,2	1,8	2,9	C17	
Colon	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	2	15	13	13	6	13	6	77	3	6,8	46,7	24,3	35,8	C18	
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	5	7	9	9	5	4	51	1,9	4,5	30,9	16,3	24,2	C19-C21	
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	10	12	14	9	3	64	2,2	5,7	38,8	18,7	28,6	C22	
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	3	10	0,2	0,9	6,1	7,2	4,7	C23-C24	
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5	3	0	2	1	3	20	0,7	1,8	12,1	7,2	10,3	C25	
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	5	6	1	0	20	0,8	1,8	12,1	6	8,9	C32	
Polmone	0	0	0	0	0	0	2	1	3	11	12	15	19	31	25	21	7	147	5,5	13,0	89,1	44	66,6	C33-C34	
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0,2	1,2	0,6	0,8	C37-C39	
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	5	0,3	0,4	3,0	2	2,7	C45	
Tessuti molli	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0,2	0,3	1,8	1,9	1,9	C47,C49	
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0,2	1,2	0,8	1	C46	
Pelle, melanomi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4	2	1	3	1	0	18	0,7	1,6	10,9	6,6	9	C43	
Pelle, non melanomi	0	0	0	1	0	3	1	8	6	13	17	17	23	32	28	15	10	174	6,7	15,4	105,4	56,3	82,5	C44	
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	16	31	39	29	13	4	145	6,2	12,9	87,9	42,9	64,7	C61	
Testicolo	0	0	0	1	0	3	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0,5	1,2	7,9	7,2	7,4	C62	
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	5	0,2	0,4	3,0	1,8	2,4	C60	
Vescica	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	9	8	18	17	8	5	5	77	3,5	6,8	46,7	25	36,7	C67	
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	5	10	6	6	4	1	39	1,6	3,5	23,6	12,5	17,9	C64-C66,C68	
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0,2	1,2	0,7	1,1	C69	
Encefalo e altro SNC	0	0	0	1	0	2	0	2	2	2	0	3	0	0	1	0	0	13	0,5	1,2	7,9	6	7,2	C70-C72	
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	1	0	6	0,2	0,5	3,6	2,3	3,2	C73	
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,1	0,1	0,6	0,4	0,5	C81	
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	1	4	7	7	5	0	35	1,3	3,1	21,2	10,6	15,5	C82-C85,C96	
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	4	2	14	0,4	1,2	8,5	3,8	6	C88-C90	
Leucemia linfatica	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2	1	12	0,5	1,1	7,3	7,5	7,1	C91	
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	3	3	1	13	0,3	1,2	7,9	3,8	5,7	C92	
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	2	6	5	11	8	3	43	1,2	3,8	26,1	11,8	18,6	OeU	
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>110</b>	<b>147</b>	<b>176</b>	<b>160</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>954</b>	<b>36,3</b>	<b>84,6</b>	<b>578,1</b>	<b>303,1</b>	<b>441,5</b>	<b>ALLB</b>	
Tutte le sedi	2	2	0	2	3	4	15	12	27	36	67	80	127	170	208	188	126	59	1128	43,1	100	683,5	359,4	524,1	ALLT



**Tabella 28: Vallagarina. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0,1	0,2	1,2	0,3	0,5	C00
Lingua	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0,1	0,3	1,7	0,9	1,3	C01-C02
Bocca	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0,1	0,3	1,7	0,7	1,1	C03-C06
Rinofaringe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,1	0,2	2,3	0,9	1,1	C11
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0,1	0,4	2,3	0,5	0,9	C15
Stomaco	0	0	0	1	0	1	3	6	4	33	0,7	3,2	19,1	6,8	10,1	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0,1	0,4	2,3	0,5	0,9	C17
Colon	0	0	0	0	1	2	5	9	17	70	1,7	6,7	40,5	13,5	20,7	C18
Retto	0	0	0	0	2	1	3	4	2	35	0,9	3,4	20,2	8,2	12,2	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	1	0	6	3	17	0,3	1,6	9,8	3,1	5	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	1	4	3	2	17	0,5	1,6	9,8	3,6	5,4	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	1	2	1	4	10	37	0,6	3,6	21,4	7,1	11,1	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,1	0,6	0,3	0,4	C32
Polmone	0	0	0	0	1	3	5	7	6	48	1,4	4,6	27,8	11,8	17,3	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,1	0,6	0,1	0,2	C37-C39
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0,1	0,3	1,7	0,5	0,8	C45
Osso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,1	0,6	1,5	1	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0,1	0,5	2,9	1,5	1,9	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	2	2	1	4	2	1	27	1	2,6	15,6	9,7	12,6	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	4	8	6	11	9	26	165	4,4	15,9	95,4	41,6	59,3	C44
Mammella	0	0	0	5	7	15	24	28	29	252	9,1	24,2	145,8	79,6	108,6	C50
Utero, service	0	0	0	0	2	3	0	1	0	7	0,3	0,7	4,0	2,8	3,8	C53
Utero, corpo	0	0	0	1	1	1	5	4	3	47	1,9	4,5	27,2	16	22	C54
Ovaio	0	0	0	1	2	0	4	3	5	30	1	2,9	17,4	8,9	12,1	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	1	2	5	2	3	27	1	2,6	15,6	8,5	11,1	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	1	3	2	3	3	24	0,7	2,3	13,9	6	8,8	C67
Rene, vie urinarie	1	0	0	0	2	0	1	4	5	18	0,3	1,7	10,4	4,5	5,7	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,1	0,6	0,4	0,6	C69
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	1	1	1	1	0	8	0,4	0,8	4,6	3,6	4,1	C70-C72
Tiroide	0	0	0	3	5	4	3	0	0	30	1,3	2,9	17,4	14	16,6	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	2	0	0	0	0	0	1	7	0,3	0,7	4,0	5,3	4,7	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	1	2	0	4	6	8	47	1,3	4,5	27,2	12,6	17,7	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	1	2	3	2	10	0,4	1,0	5,8	2,6	3,9	C88-C90
Leucemia linfatica	2	0	0	1	0	0	1	1	2	12	0,4	1,2	6,9	5,3	5,2	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	1	1	0	3	5	16	0,3	1,5	9,3	3,4	5,1	C92
Leucemie, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,1	0,6	0,1	0,2	C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	1	2	5	6	26	0,3	2,5	15,0	4	6,8	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>876</b>	<b>26,9</b>	<b>84,1</b>	<b>506,7</b>	<b>249,1</b>	<b>341,6</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>1041</b>	<b>31,4</b>	<b>100</b>	<b>602,1</b>	<b>290,7</b>	<b>400,9</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 29: Ladino di Fassa. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,0	5,4	3,2	4,8	C00	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,6	1,0	5,4	3,7	5	C01-C02	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0,8	1,9	10,9	5,3	9	C03-C06	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,0	5,4	4,1	5,7	C09-C10	
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,0	5,4	4,7	5,5	C11	
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,0	5,4	3,9	7,8	C15	
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	2	0	7	2,7	6,7	38,1	23,9	33	C16	
Colon	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	5	2	4,8	27,2	14,5	23,4	C18	
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	1,6	3,8	21,8	13,2	19,3	C19-C21	
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	0	7	1,6	6,7	38,1	18,8	31,9	C22	
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0,6	1,9	10,9	5,7	8,8	C23-C24	
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	1,4	3,8	21,8	12,8	21,4	C25	
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,6	1,9	10,9	5,9	9,2	C32	
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	1	8	3,6	7,7	43,5	28	42	C33-C34	
Osso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,0	5,4	6,1	5,4	C40-C41	
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1,6	2,9	16,3	12,2	16,1	C43	
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	4	0	1	14	6,1	13,5	76,1	44,9	70,3	C44	
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	1	2	1	14	6,2	13,5	76,1	46	70	C61	
Testicolo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,8	1,9	10,9	11	10,8	C62	
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	1	0	0	10	5	9,6	54,4	34	49,3	C67	
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1,4	2,9	16,3	10,9	17,6	C64-C66,C68	
Encefalo e altro SNC	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1,3	2,9	16,3	17,1	16,7	C70-C72	
Tiroide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	1,0	5,4	3,5	4,1	C73	
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1,0	5,4	2,1	4,2	C81	
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,6	1,0	5,4	3,7	5	C82-C85,C96	
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	1,6	3,8	21,8	13,2	19	C88-C90	
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,8	1,0	5,4	3,2	4,8	OeU	
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>90</b>	<b>36,7</b>	<b>86,5</b>	<b>489,4</b>	<b>310,7</b>	<b>450,1</b>	<b>ALLB</b>	
Tutte le sedi	0	1	0	0	1	1	0	1	2	3	7	10	9	20	19	15	9	6	104	42,8	100	565,5	355,6	520,4	ALLT

**Tabella 30: Ladino di Fassa. Casi incidenti per classi d'età e sede, tassi grezzi e standardizzati di incidenza (per 100.000), rischio cumulato, % sul totale per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-5	10-15	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75	80-85+	TOTALE	CR74	%	GREZZO	MONDO	EUROPA	ICD10
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,3	5,3	0,9	1,8	C15
Stomaco	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	4,0	16,0	8,2	11,2	C16
Colon	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1,7	4,0	16,0	9,8	14,1	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1,1	4,0	16,0	8	11,9	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4,0	16,0	4,3	8,6	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,3	5,3	1,6	3,3	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,9	2,7	10,7	8,1	10,7	C25
Polmone	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,5	1,3	5,3	3,7	4,6	C33-C34
Pelle, melanomi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,6	2,7	10,7	7,5	8,8	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	1	0	1	2	2	9	2,8	12,0	48,0	22,3	33	C44
Mammella	0	0	0	0	0	1	6	7	3	26	8,5	34,7	138,7	75,5	109,2	C50
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1,3	5,3	4,6	5,3	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1,9	5,3	21,3	15,4	20,1	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,3	5,3	1,6	3,3	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1,9	6,7	26,7	11,5	17,9	C51-C52,C57
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2,7	10,7	2,2	4,5	C64-C66,C68
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4,0	16,0	4,3	8,6	C82-C85,C96
Leucemia linfatica	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0,3	2,7	10,7	5,6	7,9	C91
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,6	1,3	5,3	3,6	4,7	C92
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0,5	2,7	10,7	4,9	8	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>20</b>	<b>88,0</b>	<b>352,0</b>	<b>181,4</b>	<b>264,6</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	0	0	0	0	2	4	2	8	8	75	22,7	100	400	203,7	297,5	ALLT

**Tabella 31: Provincia di Trento. Mortalità per classi d'età e sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	2	2	3	0	3	0	18	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	0	1	1	9	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	4	2	2	3	21	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8	4	4	2	1	6	1	30	C09-C10
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	C11
Ipotaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	1	0	1	11	C12-C13
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	1	2	1	1	14	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	11	18	17	23	25	11	7	118	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	13	20	19	30	45	43	34	219	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	0	9	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	16	26	37	42	38	47	32	249	C18
Retto	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	5	10	10	15	20	22	13	14	117	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	15	22	44	42	54	38	13	242	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	8	12	5	9	14	6	57	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	14	14	32	26	20	18	7	146	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	10	14	6	14	16	1	74	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	23	54	80	104	134	154	123	60	744	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	2	0	1	9	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	0	8	C45
Osso	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	9	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	0	9	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	6	3	3	0	2	5	2	28	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	4	12	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	C50
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	26	38	62	78	70	295	C61
Testicolo	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	C62
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	C60
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	C60
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	15	33	28	31	31	154	C67
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	12	19	13	22	8	85	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	C69
Tiroide	0	0	0	0	1	0	1	3	5	1	8	7	6	12	12	8	6	3	73	C70-C72
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	9	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	C74-C75
Linfoma non Hodgkin	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	6	8	5	9	12	7	11	64	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8	9	12	16	8	58	C88-C90
Leucemie	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	3	4	22	19	15	6	81	C91-C95
Mal definite e metastasi	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	8	12	17	25	37	33	37	23	198	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>108</b>	<b>292</b>	<b>420</b>	<b>536</b>	<b>592</b>	<b>563</b>	<b>348</b>	<b>3186</b>	ALLB
Tutte le sedi	0	1	3	1	4	3	4	4	14	24	55	108	294	420	539	592	566	352	3198	ALLT

**Tabella 32: Provincia di Trento. Mortalità per classi d'età e sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	4	11	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	C09-C10
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	5	5	6	22	C15
Stomaco	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	5	3	3	6	21	34	44	43	164	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	8	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	14	13	15	18	39	48	45	201	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	4	8	7	12	8	24	71	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	6	10	15	23	22	26	107	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	7	15	14	20	19	85	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	12	10	20	21	39	31	35	173	C25
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	6	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	4	4	1	1	12	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	15	20	30	36	37	54	47	257	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	6	C37-C39
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	2	1	12	C45
Ossso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	5	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	2	4	4	3	18	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	2	1	2	5	17	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	1	3	13	23	19	30	33	38	40	44	60	60	364	C50
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	6	7	13	5	41	C55
Utero, cervice	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	1	1	0	3	4	2	17	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	5	5	4	5	32	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	18	17	23	23	19	15	131	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	4	2	11	29	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	7	7	16	21	60	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	3	1	3	14	16	15	59	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C69
Encefalo e altro SNC	1	0	0	0	0	1	0	2	3	1	5	6	11	11	12	14	12	8	87	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	6	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	2	18	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	4	4	5	8	17	21	12	77	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	7	11	17	10	13	63	C88-C90
Leucemie	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	3	5	4	5	8	13	27	20	92	C91-C95
Mal definite e metastasi	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	11	9	7	26	38	52	88	237	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>77</b>	<b>141</b>	<b>163</b>	<b>208</b>	<b>305</b>	<b>429</b>	<b>520</b>	<b>546</b>	<b>2502</b>	<b>ALLB</b>
<b>Tutte le sedi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>141</b>	<b>163</b>	<b>208</b>	<b>305</b>	<b>429</b>	<b>522</b>	<b>553</b>	<b>2512</b>	<b>ALLT</b>

**Tabella 33: Provincia di Trento. Tassi grezzi di mortalità (per 100.000) specifici per età e sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	C00
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	2,8	3	4,8	3,7	4,3	7,8	0	14,5	0	0	1,9	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,5	1,6	3,7	0	5,2	0	4,8	9,2	0	0,9	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	7,9	1,8	2,1	10,4	6,5	9,6	27,6	0	2,2	C03-C06
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	4,5	12,7	7,4	2,1	5,2	3,2	28,9	9,2	0	3,1	C09-C10
Ipotifaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	2,6	0	4,8	9,2	0	0,4	C11
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	3,2	1,8	6,4	5,2	3,2	0	9,2	0	1,1	C12-C13
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	3	4,8	1,8	4,3	2,6	6,5	4,8	9,2	0	1,4	C14
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	2,8	4,5	17,4	33,1	36,4	60,1	81,1	53	64,5	0	12,2	C15
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	8,3	7,5	20,6	36,8	40,7	78,4	146	207,3	313,3	0	22,6	C16
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,1	9,7	4,8	0	0	0,9	C17
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,4	13,5	25,4	47,8	79,3	109,7	123,3	226,5	294,8	0	25,7	C18
Fegato	0	0	0	0	0	1,6	0	1,2	2,4	5,5	7,5	15,9	18,4	32,2	52,2	71,4	62,7	129	0	12,1	C19-C21
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,3	12	23,8	40,4	94,3	109,7	175,2	183,2	119,8	0	24,9	C22
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	1,5	0	14,7	25,7	13,1	29,2	67,5	55,3	0	5,9	C23-C24
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	9,7	9	22,2	25,7	68,6	67,9	64,9	86,8	64,5	0	1,5	C25
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	2,6	0	0	0	0	0,2	C30-C31
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	7,5	9,5	18,4	30	15,7	45,4	77,1	9,2	0	7,6	C32
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	1,3	2,3	6	5,5	34,5	85,7	147	222,9	350	499,8	592,9	552,8	0	76,7	C33-C34
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,5	3,2	3,7	0	0	6,5	0	9,2	0	0,9	C37-C39
Ossso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	6,4	7,8	3,2	0	0	0	0,8	C45
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	5,2	3,2	0	0	0	0,9	C40-C41
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,6	0	4,3	2,6	6,5	9,6	0	0	0,9	C47,C49
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	C46
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	9,5	5,5	6,4	0	6,5	24,1	18,4	0	2,9	C43
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	7,8	0	14,5	36,9	0	1,2	C44
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	3,2	4,8	0	0	0,3	C50
Testicolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	7,9	23,9	55,7	99,2	201,2	376	645	0	30,4	C61
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	C62
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	0	0	0	0,2	C60
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7,9	16,5	32,2	86,2	90,9	149,4	285,6	0	15,9	C67
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,4	1,5	6,3	7,4	25,7	49,6	42,2	106	73,7	0	8,8	C64-C66,C68
Encefalo e altro SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	C69
Tiroide	0	0	0	0	0	0	1,3	3,5	6	1,4	12	11,1	11	25,7	31,3	26	28,9	27,6	0	7,5	C70-C72
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	3,7	0	2,6	6,5	4,8	0	0	0,9	C73
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0,2	C74-C75
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	2,6	3,2	14,5	18,4	0	0,8	C81
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	2,8	1,5	9,5	14,7	10,7	23,5	38,9	33,7	101,4	0	6,6	C82-C85,C96
Leucemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,5	3,2	1,8	17,1	23,5	38,9	77,1	73,7	0	6	C88-C90
Mal definite e metastasi	0	1,9	0	0	0	1,6	0	0	1,2	1,4	1,5	11,1	5,5	8,6	57,5	61,7	72,3	55,3	0	8,3	C91-C95
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>6</b>	<b>2,1</b>	<b>7,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>16,2</b>	<b>29</b>	<b>76,1</b>	<b>161,9</b>	<b>345,8</b>	<b>536,6</b>	<b>900,3</b>	<b>1399,9</b>	<b>1921,2</b>	<b>2713,8</b>	<b>3207</b>	<b>328,4</b>	<b>ALLB</b>	
<b>Tutte le sedi</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>6</b>	<b>2,1</b>	<b>7,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>16,2</b>	<b>29</b>	<b>76,1</b>	<b>161,9</b>	<b>345,8</b>	<b>540,3</b>	<b>900,3</b>	<b>1407,7</b>	<b>1921,2</b>	<b>2728,2</b>	<b>3243</b>	<b>329,6</b>	<b>ALLT</b>	

**Tabella 34: Provincia di Trento. Tassi grezzi di mortalità (per 100.000) specifici per età e sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTALE	ICD10
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0,1	C01-C02
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3	0,2	C07-C08
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	1,7	0	2	2,1	7,4	12,7	1,1	C03-C06
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	1,7	1,9	2	0	2,5	3,2	0,6	C09-C10
Faringe, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,1	C14
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,6	0	0	3,8	4,1	10,5	12,3	19	2,2	C15
Stomaco	0	0	0	0	0	1,6	0	2,4	0	2,9	7,8	4,9	5,2	11,4	42,7	71,7	108,2	136	16,1	C16
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	0	1,6	0	0	2	2,1	9,8	3,2	0,8	C17
Colon	0	0	0	0	0	0	0	2,4	1,3	4,3	4,7	22,8	22,7	28,5	36,6	82,2	1,18	142,3	19,8	C18
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	6,3	4,9	7	15,2	14,2	25,3	19,7	75,9	7	C19-C21
Fegato	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	1,6	4,9	10,5	19	30,5	48,5	54,1	82,2	10,5	C22
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	4,7	1,6	7	13,3	30,5	29,5	49,2	60,1	8,4	C23-C24
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,9	1,6	19,5	17,4	38	42,7	82,2	110,7	17	C25	
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0	1,6	0	0	0	2,1	2,5	6,3	0,6	C30-C31
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	3,3	1,7	1,9	2	8,4	2,5	3,2	1,2	C32
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7,2	14,1	24,4	34,9	56,9	73,3	78	132,8	148,7	25,3	C33-C34
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	2	0	7,4	3,2	0,6	C37-C39
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	3,3	0	3,8	4,1	4,2	4,9	3,2	1,2	C45
Ossso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	4,9	3,2	0,5	C40-C41
Tessuti molli	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0	3,3	1,7	1,9	4,1	8,4	9,8	9,5	1,8	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	0,1	C46
Pelle, melanomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	5,2	1,9	4,1	2,1	4,9	15,8	1,7	C43
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	0	0	1,3	1,2	0	1,4	0	0	0	0	0	0	4,9	22,1	1	C44
Mammella	0	0	0	0	0	0	1,3	3,7	16,4	33,2	29,7	48,8	57,6	72,1	81,4	92,7	147,5	189,8	35,8	C50
Utero, NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	6,3	3,3	3,5	1,9	12,2	14,8	32	15,8	4	C55
Utero, service	0	0	0	0	0	0	0	3,7	2,5	0	0	1,6	1,7	1,9	0	6,3	9,8	6,3	1,7	C53
Utero, corpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	6,5	8,7	5,7	10,2	10,5	9,8	15,8	3,2	C54
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	1,4	4,7	17,9	31,4	32,3	46,8	48,5	46,7	47,4	12,9	C56
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,6	1,6	1,7	3,8	12,2	8,4	4,9	34,8	2,9	C51-C52,C57
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	4,7	1,6	3,5	5,7	14,2	14,8	39,3	66,4	5,9	C67
Rene, vie urinarie	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	1,4	4,7	3,3	5,2	1,9	6,1	29,5	39,3	47,4	5,8	C64-C66,C68
Occhio	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	C69
Encefalo e altro SNC	2	0	0	0	0	1,6	0	2,4	3,8	1,4	7,8	9,8	19,2	20,9	24,4	29,5	29,5	25,3	8,6	C70-C72
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	2	2,1	7,4	0	0,6	C73
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	2	1,6	0	0	0	0	0	0	1,7	1,9	0	0	0	3,2	0,2	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	10,5	14,8	6,3	1,8	C81
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	2	0	0	1,2	2,5	0	3,1	6,5	7	9,5	16,3	35,8	51,6	38	7,6	C82-C85,C96
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	3,1	3,3	0	13,3	22,4	35,8	24,6	41,1	6,2	C88-C90
Leucemie	0	0	0	0	0	3,2	1,3	1,2	1,3	2,9	4,7	8,1	7	9,5	16,3	27,4	66,4	63,3	9,1	C91-C95
Mal definite e metastasi	0	0	2,1	2,2	0	0	0	1,2	1,3	0	3,1	17,9	15,7	13,3	52,9	80,1	127,9	278,4	23,3	OeU
Tutte le sedi meno cute	2	0	2,1	2,2	6,1	9,6	5,3	23,1	39	67,9	120,4	229,1	284,3	394,8	620,8	904,3	1278,7	1727	246,3	ALLB
Tutte le sedi	2	0	2,1	2,2	6,1	9,6	5,3	23,1	39	69,3	120,4	229,1	284,3	394,8	620,8	904,3	1283,6	1749	247,3	ALLT

**Tabella 35: Provincia di Trento. Tassi standardizzati di mortalità (per 100.000), rischio cumulato e proporzione sul totale specifici per sede. Anni 2003-2006. MASCHI**

SEDE	Mondo	Europa 99-02	Europa 03-06	Cum 74	%	ICD10
Labbro	0		0,1	0	0	C00
Lingua	1,1		1,5	0,1	0,6	C01-C02
Ghiandole salivari	0,5		0,8	0,1	0,3	C07-C08
Bocca	1,1		1,8	0,1	0,7	C03-C06
Orofaringe	1,8		2,5	0,2	0,9	C09-C10
Rinofaringe	0,2		0,3	0	0,1	C11
Ipofaringe	0,7		1,0	0,1	0,3	C12-C13
Faringe, NAS	0,8		1,2	0,1	0,4	C14
Esofago	6,2	13,3	9,3	0,8	3,7	C15
Stomaco	10,3	17,4	16,6	1,0	6,8	C16
Intestino tenue	0,4		0,6	0,1	0,3	C17
Colon	12,2	19,4	19,2	1,4	7,8	C18
Retto	6,1	8,0	9,3	0,7	3,7	C19-C21
Fegato	12,0	17,3	18,5	1,4	7,6	C22
Vie biliari	2,8	4,0	4,3	0,3	1,8	C23-C24
Pancreas	7,9	13,3	11,7	1,0	4,6	C25
Cavità nasali	0,1		0,2	0	0,1	C30-C31
Laringe	3,8		5,7	0,4	2,3	C32
Polmone	36,4	67,4	56,8	4,3	23,3	C33-C34
Altri organi toracici	0,5		0,8	0	0,3	C37-C39
Mesotelioma	0,5	1,9	0,6	0,1	0,3	C45
Osso	0,9	0,8	0,9	0,1	0,3	C40-C41
Tessuti molli	0,4		0,7	0	0,3	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0		0,1	0	0	C46
Pelle, melanomi	1,6	2,1	2,3	0,2	0,9	C43
Pelle, non melanomi	0,6	0,7	0,9	0,1	0,4	C44
Mammella	0,1		0,2	0	0,1	C50
Prostata	12,3	22,8	21,4	1,0	9,2	C61
Testicolo	0,3	0,2	0,4	0	0,1	C62
Pene	0,1		0,1	0	0,1	C60
Vescica	6,9	13,6	11,6	0,7	4,8	C67
Rene, vie urinarie	3,9	6,9	6,2	0,5	2,7	C64-C66,C68
Occhio	0		0	0	0	C69
Encefalo e altro SNC	4,3	8,0	6,1	0,5	2,3	C70-C72
Tiroide	0,7	0,5	0,8	0,1	0,3	C73
Altre ghiandole endocrine	0,1		0,2	0	0,1	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0,3	0,8	0,6	0	0,3	C81
Linfoma non Hodgkin	3,5	4,6	5,2	0,3	2,0	C82-C85,C96
Mieloma	2,5	4,2	4,2	0,2	1,8	C88-C90
Leucemie	3,9	7,8	6,0	0,5	2,5	C91-C95
Mal definite e metastasi	9,8		15,2	1,1	6,2	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>156,7</b>		<b>245,0</b>	<b>17,5</b>	<b>99,6</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	157,3	270,7	245,9	17,5	100	ALLT



**Tabella 36: Provincia di Trento. Tassi standardizzati di mortalità (per 100.000), rischio cumulato e proporzione sul totale specifici per sede. Anni 2003-2006. FEMMINE**

SEDE	Mondo	Europa 99-02	Europa 03-06	Cum 74	%	ICD10
Lingua	0,1		0,1	0	0	C01-C02
Ghiandole salivari	0		0,1	0	0,1	C07-C08
Bocca	0,3		0,5	0	0,4	C03-C06
Orofaringe	0,3		0,4	0	0,2	C09-C10
Faringe, NAS	0		0,1	0	0	C14
Esofago	0,6	1,5	1,0	0,1	0,9	C15
Stomaco	4,4	6,2	7,2	0,4	6,5	C16
Intestino tenue	0,2		0,3	0	0,3	C17
Colon	6,2	11,5	9,9	0,6	8,0	C18
Retto	2,3	5,0	3,7	0,2	2,8	C19-C21
Fegato	3,1	4,9	5,0	0,3	4,3	C22
Vie biliari	2,6	5,1	4,1	0,3	3,4	C23-C24
Pancreas	5,6	9,4	8,8	0,6	6,9	C25
Cavità nasali	0,2		0,3	0	0,2	C30-C31
Laringe	0,5		0,7	0,1	0,5	C32
Polmone	9,2	11,9	13,9	1,1	10,2	C33-C34
Altri organi toracici	0,2		0,2	0	0,2	C37-C39
Mesotelioma	0,5	0,7	0,7	0,1	0,5	C45
Osso	0,2	0,2	0,3	0	0,2	C40-C41
Tessuti molli	0,6		0,9	0,1	0,7	C47,C49
Sarcoma di Kaposi	0		0	0	0	C46
Pelle, melanomi	0,7	1,7	1,0	0,1	0,7	C43
Pelle, non melanomi	0,2	0,2	0,4	0	0,4	C44
Mammella	15,4	27,4	22,3	1,7	14,5	C50
Utero, NAS	1,4		2,1	0,1	1,6	C55
Utero, cervice	0,7	0,5	1,0	0,1	0,7	C53
Utero, corpo	1,3	0,7	1,9	0,2	1,3	C54
Ovaio	5,2	8,1	7,8	0,7	5,2	C56
Altri genitali femminili	0,9		1,5	0,1	1,2	C51-C52,C57
Vescica	1,6	2,5	2,6	0,1	2,4	C67
Rene, vie urinarie	1,7	2,6	2,7	0,1	2,3	C64-C66,C68
Occhio	0,2		0,1	0	0	C69
Encefalo e altro SNC	4,1	5,5	5,6	0,5	3,5	C70-C72
Tiroide	0,2	0,7	0,3	0	0,2	C73
Altre ghiandole endocrine	0,1		0,1	0	0,1	C74-C75
Linfoma di Hodgkin	0,7	0,3	0,9	0	0,7	C81
Linfoma non Hodgkin	2,5	3,9	3,8	0,2	3,1	C82-C85,C96
Mieloma	1,9	3,3	3,1	0,2	2,5	C88-C90
Leucemie	3,0	5,1	4,6	0,3	3,7	C91-C95
Mal definite e metastasi	6,3		10,3	0,5	9,4	OeU
<b>Tutte le sedi meno cute</b>	<b>84,9</b>		<b>130</b>	<b>9,0</b>	<b>99,6</b>	<b>ALLB</b>
Tutte le sedi	85,1	134,4	130,4	9,0	100	ALLT